

10  
635  
Cat.  
Baum

# ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

## D'AUGUSTIN ET NAPOLEON BAUMANN,

HORTICULTEURS-PROPRIÉTAIRES,  
à **BOLLWILLER, Haut-Rhin (France).**

---

### Prix-Courant

**DES PLANTES DE SERRE-CHAUDE ET D'ORANGERIE**

**POUR L'AUTOMNE 1847 ET LE PRINTEMPS ET L'ÉTÉ 1848.**

---

#### CONDITIONS.

Les commandes devront mentionner exactement l'adresse du destinataire et la marche à suivre pour l'expédition.

TERMES DE PAIEMENT. A moins d'ordre contraire, nous ferons suivre en remboursement le prix des expéditions qui ne s'élèvent pas à 50 fr., afin d'éviter les frais d'encaissement, qui, multipliés, deviennent onéreux.

Sont naturellement exceptées de cette règle les personnes qui ont un compte ouvert chez nous. L'emballage se paye séparément, dans la proportion la plus équitable de son coût.

**ON EST PRIÉ D'AFFRANCHIR.**

---

Man ist gebeten die Adressen genau anzugeben und die Art der Versendung zu bestimmen; im entgegen-  
gesetzten Fall wird man gewöhnlich die Sache per Eilwagen versenden.

Ohne ausdrücklichen Gegenbefehl wird der Betrag der Bestellungen die sich nicht über 50 Fr. belaufen  
nachgenommen werden, um die gewöhnlich hochlaufenden Incassospesen zu vermeiden.

Das Verpacken wird besonders, jedoch so billig als möglich verrechnet werden.

**Man bittet zu frankiren.**

---

**MULHOUSE,**  
IMPRIMERIE DE P BARET, PLACE DE LA BOURSE, 2.

**1847.**



# PLANTES DE SERRE CHAUDE. — Warmehaus = Pflanzen.

## OBSERVATIONS.

Les époques les plus convenables pour les expéditions des plantes de serre, sont les mois d'Avril, Mai, Septembre et Octobre; si la distance n'excède pas 15 à 20 myriamètres, on peut aussi faire les envois dans les autres mois de l'été.

Il peut nous arriver, à la suite de fortes demandes, que nous manquions momentanément de quelques plantes portées sur notre catalogue; nous prions nos commettants de nous autoriser à les remplacer par des nouveautés analogues, ou de nous indiquer eux-mêmes les sujets de remplacement.

Nous apporterons les soins les plus scrupuleux au bon conditionnement de nos envois, QUI VOYAGERONT AUX RISQUES ET PÉRILS DE NOS COMMETTANTS.

A la réception de plantes de serre restées en route pendant quelque temps, on fera bien de les placer dans une couche chaude, d'enfoncer le pot dans la tannée et de garantir les plantes pendant quelques jours du contact de l'air et des rayons solaires. Lorsqu'on s'apercevra qu'elles commencent à reprendre, on les habituera graduellement, d'abord au soleil et ensuite à l'air. De cette façon, on parviendra facilement à les conserver, en ménageant leur retour à l'état normal, interrompu par la privation de l'air et de la lumière pendant le trajet.

## Bemerkungen.

Die günstigsten Zeitpunkte für die Versendungen der Gewächshaus-Pflanzen sind die Monate April, Mai, September und October; wenn die Entfernung nicht 15 bis 20 Myriameter übersteigt, können dieselben auch in den übrigen Sommermonaten gemacht werden.

Da der Fall eintreten könnte, daß in Folge eines starken Absatzes die eine oder die andere in unserem Verzeichniß enthaltene Pflanze für den Augenblick fehlet, so beliebe man bei den Bestellungen zu bemerken, ob uns die Wahl der zu ersetzenden Sorten überlassen wird, oder man wolle uns dieselben selbst anzeigen.

Wir werden die gewissenhafteste Sorgfalt auf gute Verpackung unserer Versendungen verwenden, welche auf Gefahr und Kosten der Käufer versendet werden.

Beim Empfang von Hauspflanzen, welche einige Zeit auf der Reise zugebracht haben, thut man wohl dieselbe in's warme Haus oder in ein gedecktes Mißbeet zu bringen, die Töpfe in die Lohse einzusetzen und die Pflanzen einige Zeit gegen die Berührung der äußern Luft und die Sonnenstrahlen zu schützen. Sobald man ihre Erholung gewahr wird, muß man sie nach und nach, zuerst an das Sonnenlicht, und dann an die freie Luft gewöhnen. Auf diese Weise wird man sie leicht davonbringen und zu dem ursprünglichen Zustande zurückführen, welcher durch den Mangel an Luft und Licht auf der Reise gestört worden war.

La pièce. Das Stück.	fr. c.
ABUTILON venosum. . . . .	1 à 4 »
ACHIMENES alba. <i>Niphaea oblongata</i>	» 75
argyrostigma . . . . .	1 »
Bradini . . . . .	1 50
coccinea (Pers.). <i>Trevirana coccinea</i>	» 75
rosea . . . . .	» 75
grandiflora (DC.). <i>A. Ghiesbreghtii</i> .	1 à 2 »
le 100 bubilles. Die 100 Knollen.	8 »
hirsuta . . . . .	1 »
igneae . . . . .	1 »
ilicifolia . . . . .	1 »
Liebmanni . . . . .	2 »
longiflora (DC.). . . . .	1 à 2 »
multiflora . . . . .	2 »
patens. . . . .	6 »
pedunculata . . . . .	1 50
picta . . . . .	1 50
tubiflora . . . . .	2 50
le 100 bubilles. Die 100 Knollen.	10 »
ACHMEA discolor. . . . .	20 à 30
fulgens . . . . .	10 à 30
AGAVE foetida, forte plante. . . . .	8 »
ALETRIS fragran . . . . .	2 à 4 »
ALPINIA malabarica. . . . .	2 »
nutans (Bot. Mag.). <i>Renanthera nu-</i>	
tans (And.). . . . .	2 »
spiralis (Jacq.) . . . . .	3 »
ALYXIA Richardsoni (Bot. Reg.). . . . .	3 »
AMARYLLIS aulica (Ker.). . . . .	2 à 4 »
aurea (Bot. Reg.) . . . . .	3 »
advena (Ker.). . . . .	3 à 5 »
Atamasco minor (L.). . . . .	1 »
blanda (Bot. Mag.). . . . .	2 »
longifolia (Ait.). . . . .	4 »
Forte à fleurir. Blühbare Pflanzen.	15 »
coccinea . . . . .	3 à 5 »
crispa (J.). <i>Strumaria crispa</i> (B. M.)	1 »
Fothergilia (Andr.). . . . .	3 »
Gravini . . . . .	5 »
Reginae (L.). . . . .	2 50 à 5
Johnsoni (Lodd.). . . . .	3 »
JOSEPHINE (Red.). <i>Brunswigia Jose-</i>	
phine. . . . .	5 à 25 »
Un exemplaire qui a déjà fleuri	
plusieurs fois. Eine Pflanze die	
schon mehrere Male geblüht hat . . . . .	30 »
maranensis. <i>Hippeastrum stylosum</i> .	10 »
purpurea (Ait.). . . . .	3 »
vittata? . . . . .	3 »
AMOMUM cardamomum . . . . .	2 »
ARALIA arborea (Lin.). . . . .	4 à 8 »
umbellifera (Lam.). . . . .	3 »
ARDISIA colorata (Link.). . . . .	3 à 5 »
complanata Flor. ind. . . . .	3 »
hymenandra (Wall.). . . . .	4 à 10 »
humilis (Vahl.). . . . .	3 »
ARYSTEA cyanea (Ait.). . . . .	3 »
ARTHROSTEMMA parietarium. <i>Centrade-</i>	
nia rosea. . . . .	1 50

La pièce. Das Stück.	fr. c.
ARUM bicolor. . . . .	1 50
campanulatum? . . . . .	10 »
Colocasia (L.). <i>Colocasia antiquo-</i>	
rum. . . . .	2 à 20 »
cordifolium. . . . .	4 »
discolor . . . . .	3 »
indicum . . . . .	40 »
Maffia . . . . .	60 »
sagittæfolium . . . . .	2 »
ASPIDISTRA elatior fol. var. . . . .	2 à 5 »
ASTRÆA Wallichii (Ker.). . . . .	2 à 20 »
BAMBUSA arundinacea (Retz.). . . . .	3 »
BANISTERIA argentea. <i>Heteropteris ar-</i>	
gentea. . . . .	10 »
laurifolia (Lin.). . . . .	4 »
BARBACENIA purpurea (Hook.). . . . .	2 »
BAUMANNIA geminiflora (DC.). . . . .	5 »
BEAUMONTIA grandiflora (Bot. Reg.). . . . .	3 »
BEGONIA argyrostigma (Bot. Reg.), <i>ma-</i>	
culata (Red.). . . . .	1 50
canaliculata . . . . .	3 »
coccinea . . . . .	4 »
discolor (Smith.). . . . .	1 »
Dregei (H. Berol.). . . . .	1 »
grandis (Dryand.). . . . .	3 »
hybrida . . . . .	2 »
hydrocotylefolia . . . . .	1 à 3 »
mærophylla (Dryand.). . . . .	2 »
manicata . . . . .	2 »
muricata . . . . .	2 »
nitida discolor . . . . .	1 50
Noacki . . . . .	1 50
papillosa (Grah.). . . . .	1 50
peltata . . . . .	1 à 3 »
peponæfolia . . . . .	2 »
punctata (H.). <i>B. maculata</i> . . . . .	2 »
semperflorens (Lk. et Otto) . . . . .	1 »
sinuata (Wall.). . . . .	3 »
Species du Brésil. <i>B. coccinea?</i> . . . . .	4 »
ulmifolia . . . . .	1 »
vitifolia . . . . .	1 50
Warsowizki, hybride du <i>B. mani-</i>	
cata. . . . .	2 50
BILLBERGIA clavata (Lindl.). . . . .	2 à 3 »
intermedia . . . . .	3 »
iridifolia (Lind.). . . . .	3 »
pyramidalis (Lind.). . . . .	1 50
zebrina . . . . .	4 »
BOMBAX Ceiba (L.). <i>B. malabaricum</i> . . . . .	2 à 8 »
BONAPARTEA elegans (Hort.). <i>Roulinia</i>	
Brong. . . . .	10 à 30
juncea (R. P.). . . . .	5 à 60 »
filamentosa . . . . .	4 à 40 »
BOOPHONA ciliaris (Herb.). . . . .	6 »
BREXIA madagascariensis (H. Kew.). . . . .	6 »
serrata (Presl.). . . . .	8 »
BROMELIA Ananas (Linn.). . . . .	2 à 6 »
à feuilles panachées. . . . .	6 à 10 »
à feuilles lisses, recom-	

La pièce. Das Stück.	fr. c.
mandable par la qualité de son	
fruit . . . . .	8 à 15 »
BROMELIA Antiochia black. . . . .	10 »
bracteata . . . . .	2 à 15 »
Enville . . . . .	10 »
globe, gros fruit . . . . .	6 à 12 »
hémisphérique, gros fruit . . . . .	6 à 12 »
Karatas . . . . .	5 »
macrocarpa . . . . .	10 »
nervosa . . . . .	10 »
ANANAS DE LA MARTINIQUE	
ou COMMUN. . . . .	» »
Plantes d'une année, les 12 . . . . .	45 »
» de 2 années, » . . . . .	56 »
» de 3 années, » . . . . .	70 »
BROSIMUM microcarpum . . . . .	3 »
BRUGMANSIA arborea non. <i>B. candida</i> .	4 »
floribunda . . . . .	3 »
Knightii . . . . .	1 »
BRUNFELSIA americana (Lin.). . . . .	3 »
violacea . . . . .	2 »
BULBINE pugioniformis (Link.). . . . .	3 »
CALADIUM odoratum (Roxb.). . . . .	4 à 6 »
CALOSTEMMA Cunninghami (Ait.). . . . .	10 »
CANN grandis. . . . .	4 »
Lambertii? . . . . .	3 »
leptochila (Bouché). . . . .	3 »
longifolia glauca du Brésil. . . . .	5 »
patens (Rose.). . . . .	2 »
spectabilis . . . . .	5 »
CAROLINEA alba . . . . .	10 »
insignis (Hort.). . . . .	8 »
CASTANOSPERMUM australe (Cunningh.). . . . .	10 »
CATESBÆA spinosa (L.). . . . .	2 »
CECROPIA peltata (Lin.). . . . .	4 »
CERBERA Thevetia (Linn.). . . . .	5 »
CEROPEGIA stapeliæformis (Haw.). . . . .	2 »
CHAMBERLAYNIA spectabilis. . . . .	6 à 15 »
CHEIROSTEMUM platanoides (H. et B.). . . . .	5 »
CLAVIA ornata (Don.). . . . .	20 »
CLIVEA nobilis (Lind.). . . . .	1 à 25 »
CLEOME gigantea (Willd.). . . . .	4 »
CLERODENDRON speciosum . . . . .	5 »
fragrans (Willd.). <i>Valkameria japo-</i>	
nica (Th.). . . . .	1 à 3 »
flore pleno . . . . .	1 à 3 »
hastatum (Wall.). . . . .	2 »
calamitosum (Linn.). . . . .	4 »
papilio . . . . .	6 »
splendens (Knight.). . . . .	4 à 8 »
flore albo . . . . .	6 »
squamatum verum . . . . .	3 à 5 »
COBURGIA flava? . . . . .	4 »
falva (Herbert.). . . . .	2 »
COCCOLOBA barbadensis . . . . .	25 »
laurifolia . . . . .	8 »
pubescens . . . . .	10 à 20
Rheifolia (Desf.). <i>C. latifolia</i> . . . . .	20 »
COFFEA arabica (L.). . . . .	3 à 25 »



<i>La pièce. Das Stück</i>	fr. c.	<i>La pièce. Das Stück</i>	fr. c.	<i>La pièce. Das Stück</i>	fr. c.
COFFEA species de la Havanne. . . . .	5 »	CALACTODENDRON utile (H. B.), vera. . . . .	20 »	JASMINUM Sambac (Ait.), flore pleno. . . . .	1 50 à 3
COLUMNEA crassifolia . . . . .	2 à 5 »	GARDENIA florida (L.). . . . .	1 à 3 »	Grand-duc de Toscane . . . . .	8 »
longifolia (L.). . . . .	4 »	flore pleno . . . . .	1 à 3 »	multiflorum. . . . .	5 »
CORDIA speciosa (Willd.) . . . . .	10 »	latifolia (Ait.). . . . .	3 à 6 »	JUSTICIA carnea superba. <i>J. velutina</i> . . . . .	3 »
COSTUS spiralis . . . . .	» »	lucida (Roxb.) . . . . .	2 à 4 »	chinensis. . . . .	3 »
CRINUM amabile . . . . .	5 à 20 »	radicans (Thunb.) . . . . .	1 à 3 »	cristata (Jacq.) . . . . .	2 »
americanum . . . . .	4 à 8 »	<i>Greffé en tige sur G. Florida. Auf</i>		flava? . . . . .	3 »
aquaticum (Burch.). . . . .	4 »	Stämme von G. Florida gewiegt . . . . .	5 »	oblongata (Link.) . . . . .	2 »
Caribæum (Bot. Mag.) . . . . .	5 à 10 »	Scherbourniana . . . . .	6 »	speciosa . . . . .	3 à 4 »
erubescens . . . . .	5 à 20 »	tetrasperma (Roxb.) . . . . .	2 »	KÆMPFERA elegans. <i>Monolophus ele-</i>	
latifolium (Roxb.), fort. . . . .	20 »	GASTONIA palmata (Roxb.) . . . . .	15 à 50	gans . . . . .	2 à 5 »
species de Sumatra . . . . .	25 »	GESSNERIA aggregata (Ker.). . . . .	2 »	longa (Jacq.) . . . . .	1 à 4 »
strictum (Horum.) . . . . .	10 »	bulbosa (Ker.). . . . .	1 50	ovata . . . . .	2 »
CURCULIGO recurvata (Dryand.) . . . . .	2 à 5 »	Cooperi . . . . .	3 »	KOOKIA punctata. . . . .	8 à 10 »
CYRTANTHUS spiralis (Brach.). . . . .	5 »	Douglassii . . . . .	2 »	LANTANA Selioi (Link.) . . . . .	1 »
DASYLIRION filiforme . . . . .	15 »	elongata (H. B.). . . . .	3 »	species? . . . . .	5 »
angustifolium . . . . .	15 »	faucialis (Lindl.). . . . .	3 »	LAURUS Cinnamomum. . . . .	8 »
species du Mexique . . . . .	35 »	Geroldiana. . . . .	10 »	involucrata . . . . .	4 »
nova latifolia, fort. . . . .	60 »	grandis (Sw.). . . . .	3 »	Persea (Willd.). <i>Persea gratissima</i>	
DESMODIUM alatum (DC.) . . . . .	4 »	hirsuta (H. B.) . . . . .	1 50	(Gært.) . . . . .	30 »
gyrans. . . . .	2 à 8 »	Huttei nova. . . . .	2 »	LIMONIA spectabilis. . . . .	15 à 30
gyroides (DC.) . . . . .	8 »	pendulina. <i>G. aggregata</i> . . . . .	2 »	trifoliata (L.) . . . . .	2 »
species du Madagascar . . . . .	4 »	rutila (Lindl.). . . . .	3 »	LOBELIA surinamensis. <i>Centropogon su-</i>	
DIANELLA cœrulea (Smith.). . . . .	2 »	sceptrum. . . . .	4 »	rinamensis . . . . .	5 »
DICHORISANDRA ovata (Mart.). . . . .	5 à 20 »	Schotti (Mikan.). . . . .	1 50	LUCULIA gratissima (Sweet.) . . . . .	3 à 8 »
DIONÆA muscipula (L.) . . . . .	3 à 6 »	species du Brésil. . . . .	10 »	pinceana. . . . .	8 à 20 »
DIPLATENIA atropurpurea . . . . .	4 à 6 »	superba . . . . .	10 »	MAGNOLIA fuscata (Andr.) . . . . .	2 à 6 »
DOMBEYA Erythroxylon . . . . .	3 »	tomentosa (Spr.). . . . .	3 »	pumila. . . . .	2 à 4 »
DORYANTHUS excelsa . . . . .	10 à 20	Zebrina . . . . .	1 à 3 »	MALVA umbellata (Cav.) . . . . .	2 »
DRACÆNA adivaryllifolia? . . . . .	10 »	GLOBA erecta (Red.) . . . . .	3 »	MANETTIA cordifolia (Mart.) . . . . .	2 »
arborea (Link.) . . . . .	5 »	GLOXINIA caulescens . . . . .	1 à 1 50	MARANTA capitata (R. et B.) . . . . .	3 »
australis (Forst.), fort. . . . .	10 »	maculata (l'Hérit.) . . . . .	2 »	grandis . . . . .	2 »
brasiliensis (Hort.). . . . .	8 à 20 »	maxima . . . . .	2 »	zebrina (Spr.). <i>Calathea zebrina</i> (B.	
Draco (Willd.) . . . . .	5 à 10 »	pallida. . . . .	1 à 1 50	Reg.) . . . . .	2 à 5 »
cernua (Jacq.). . . . .	8 »	Cerina. . . . .	2 à 3 »	MARICA cœlestis (Lehm.). . . . .	1 50
ensifolia (Haw.). . . . .	10 à 12 f.	digitaliflora. . . . .	3 à 8 »	Northiana . . . . .	2 »
nigra . . . . .	20 »	Donglassii . . . . .	1 à 1 50	MELASTOMA cymosum (Vent.). . . . .	2 »
paniculata? an. nova . . . . .	4 »	formosa . . . . .	2 »	cœruleum . . . . .	3 »
reflexa (Lmk.). . . . .	3 »	gesnerioides . . . . .	3 à 6 »	macrocarpum . . . . .	4 »
salicifolia. . . . .	4 »	Goodii . . . . .	3 »	macrophyllum. . . . .	3 »
terminalis (L.). . . . .	2 à 5 »	hirsuta . . . . .	1 à 3 »	sanguineum . . . . .	4 »
foliis variegatis . . . . .	2 à 10 »	hybrida . . . . .	2 »	Selloi . . . . .	1 50
undulata? . . . . .	10 »	insignis rubra. . . . .	5 »	MIMOSA quadrangularis . . . . .	3 »
DYCKIA rariflora (Sculd.). . . . .	3 »	Menziesi. . . . .	1 à 2 »	pudica (Linn.) . . . . .	1 »
remotiflora (Otto) . . . . .	1 à 3 »	Maziana . . . . .	5 »	MURRAYA exotica (Linn.) . . . . .	3 »
ELÆODENDRON orientale . . . . .	6 »	obscura . . . . .	1 à 3 »	MUSA rosacea (Jacq.) . . . . .	3 à 6 »
EMBRYOPTERIS glutinifera (Rox.). <i>Dios-</i>		Priestleyana. . . . .	1 »	Cavendishii (Paxt.). . . . .	3 à 10 »
pyros <i>Embryopter.</i> (Spr.) . . . . .	8 »	prœcellentissima. . . . .	1 à 2 »	coccinea (Andr.). . . . .	6 »
ERYTHRINA caffra (Bot. Reg.). . . . .	3 »	rosea . . . . .	1 50	indica rosacea nova . . . . .	10 »
arborea (Jacq.) . . . . .	4 »	rubra . . . . .	1 »	speciosa (Tenor.) . . . . .	6 à 10 »
crista galli . . . . .	1 50 à 5	RUBRA SPECIOSISSIMA, nouveau		Zebrina . . . . .	10 à 20
laurifolia. . . . .	4 »	gain superbe . . . . .	10 »	MYRTUS pimenta (Linn.). . . . .	5 »
herbacea (L.) . . . . .	4 »	speciosa (Lod.) . . . . .	» 50	vera . . . . .	5 »
picta (Lin.). . . . .	10 »	flore albo. <i>G. candida</i> . . . . .	2 »	NAPOLEONA IMPERIALIS (Beaur.) . . . . .	15 à 40
speciosa (Andr.). . . . .	3 à 6 »	GOSYPIUM arboreum. . . . .	3 »	NEMATANTUS Guilleminii . . . . .	2 »
species. Du Mexique à belles feuilles		GUZMANNIA tricolor (R. P.). . . . .	10 à 20	NERIUM caudatum (Lam.) . . . . .	3 »
d'un vert foncé . . . . .	20 »	HABROTHAMNUS elegans . . . . .	2 »	coronarium (Ait.) . . . . .	3 »
ERYTHROCHITON brasiliense (Nus.). . . . .	10 à 25	HÆMANTHUS coccineus (Th.) . . . . .	2 à 6 »	OSBEKIA canescens . . . . .	2 »
EUPHORBIA Jacquinoflora (H.). <i>Euph.</i>		hyalocarpus. . . . .	6 »	OXALIS Barrelieri (Linn.) . . . . .	3 à 5 »
fulgens (Karv.) . . . . .	2 »	pubescens (Jacq.) . . . . .	2 à 6 »	Plumieri (Jacq.). . . . .	3 à 6 »
Breoni (Hortul.). . . . .	1 50	punicens, fort. . . . .	5 »	POGOSTEMON Patchouly . . . . .	2 »
canariensis (L.). . . . .	2 »	tigrinus . . . . .	2 à 4 »	PANCRATIUM amœnum (Salisb.) . . . . .	3 »
Caput Medusæ (L.). . . . .	1 50	ciliaris, non. <i>Buffonia ciliaris</i>	25 »	Caribæum (L.). . . . .	1 »
dendroides . . . . .	4 »	HARRACHIA speciosa (Jacq.). . . . .	2 50	Guianense (Ker.). . . . .	10 »
eliptica . . . . .	1 50	HEDYCHIUM angustifolium (Roxb.). . . . .	3 »	speciosum (Salisb.). . . . .	3 »
globosa (Sims.). . . . .	2 50	coronarium (Kœn.). . . . .	2 »	spec. nov. . . . .	5 »
lophogona (Lam.) . . . . .	5 »	Gardnerianum (Wall.). . . . .	2 50	spec. nova foliis ovato acuminatis,	
neriifolia (Linn.). . . . .	2 »	HELICONIA Bihai (Willd.) . . . . .	3 »	de Surinam. . . . .	20 »
pulcherrima (Willd.). <i>Poinsettia pul-</i>		speciosa . . . . .	3 »	PELIOSANTHES Teta (Andr.). . . . .	2 »
cherrima. . . . .	2 »	HELIOTROPIMUM grandiflorum (Schr.) . . . . .	1 50	PIPER magnoliæfolium. . . . .	3 »
splendens (Bojer) . . . . .	2 à 5 »	arborescens. . . . .	3 »	ulmifolium . . . . .	2 »
FICUS australis (Willd.) . . . . .	2 »	HEMISANDRA aurantiaca . . . . .	8 à 15 »	PISONIA aculeata . . . . .	4 à 8 »
elastica (Roxb.) . . . . .	1 50 à 10	HIBISCUS Cameronis. . . . .	1 50	PITCAIRNIA altense (L.)? . . . . .	2 à 5 »
laurifolia. . . . .	5 »	insignis? . . . . .	1 50	intermedia (Hort.). <i>P. furfuracea</i>	
oppositifolia (Roxb.). . . . .	2 »	rosa sinensis (L.) . . . . .	1 50	(R. M.) . . . . .	5 »
repens (Roxb.) . . . . .	1 »	cupreo plena . . . . .	2 »	melananthera? . . . . .	5 »
species du Brésil, feuilles luisantes		luteo pleno . . . . .	2 »	punicea . . . . .	1 à 3 »
d'un vert clair, belle plante . . . . .	10 »	purpureo pleno . . . . .	2 »	Les 12 plantes. . . . .	12 »
FOURCROYA longæva (Karw.), fort. . . . .	50 »	pedunculatus (Thunb.) . . . . .	4 »	ringens. <i>Nouv. et magnifique plante</i>	10 à 20
FRANCISCEA hydrangæiformis . . . . .	6 »	INGA pulcherrima . . . . .	2 à 4 »	staminea (Sims.). . . . .	2 »
latifolia . . . . .	3 »	species? . . . . .	8 »	snaveolens (Lindl.). . . . .	3 »
Pohlana . . . . .	3 »	JACARANDA filicifolia. . . . .	3 à 8 »	PLEROMA Benthamiana. . . . .	5 »
uniflora . . . . .	1 à 3 »	JASMINUM Azoricum . . . . .	1 à 3 »	PLUCHIA longipedunculata . . . . .	3 »
GALACTODENDRON speciosum? . . . . .	4 »	grandiflorum . . . . .	1 50 à 4	PLUMBAGO cœrulea (Humb.) . . . . .	2 »



<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>	<i>La pièce Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>	<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>
PLUMIERA rubra . . . . .	4 »	SINNINGIA villosa (Lindl.). Gloxinia vil-	2 à 4 »	gnifique plante aquatique à fleurs	40 »
POINCIANA bijuga (Lin.)? . . . . .	4 »	losa (Mart.) . . . . .	1 à 3 »	très-grandes jaune serin, de Bolivia.	10 à 25
lutea . . . . .	10 »	SIPANEA carnea . . . . .	3 »	THEOPHRASTA americana . . . . .	3 »
regia (Bojar.) . . . . .	5 à 20 »	SOLANUM giganteum (Jacq.) . . . . .	2 »	TILLANDSIA amœna (Link.) . . . . .	4 »
POLYMNIA grandis . . . . .	10 »	Herbertianum . . . . .	3 »	farinosa . . . . .	3 à 6 »
PONTERERIA crassipes (Mart.) . . . . .	1 50	quitense (N. B.) . . . . .	10 »	nigra . . . . .	3 »
POTHOS crassinervius (Jacq.) . . . . .	3 à 6 »	SPECIES DE L'HONDURAS à feuilles	3 »	pyramidalis . . . . .	10 »
cordatus (L.) . . . . .	2 »	très-larges, épineuses sur les deux		splendens . . . . .	2 »
longifolius, Anthurium longifolium		faces, fruit grand, forme et couleur		TRADESCANTIA discolor (Ait.) . . . . .	1 50
(R. S.) . . . . .	3 »	d'une orange . . . . .	4 »	ZEBRINA, pour tapisser les murs des	
undulatus . . . . .	2 »	SOLANDRA grandiflora (Swartz) . . . . .	2 à 5 »	serres chaudes . . . . .	1 »
POURRETIA pyramidata (H. B.) . . . . .	2 à 4 »	nitida (Zueg.) . . . . .	1 »	VESALIA floribunda . . . . .	1 »
PUYA Altensteinii . . . . .	2 »	SPIRONEMA fragrans . . . . .	2 à 6 »	VINCA rosea (L.) . . . . .	3 »
RENEALMIA grandiflora . . . . .	5 »	STEPHANOTIS floribunda . . . . .	6 »	rosea flore albo . . . . .	2 50
RHEXIA spec. de la Chine . . . . .	2 à 5 »	STERCULIA acerifolia (Cunningh.) . . . . .	2 50	XYLOPHYLLA arbuscula (W.) . . . . .	3 »
RHODOSTOMA gardenioides . . . . .	2 »	platanifolia . . . . .	10 à 15	falcata (W.) . . . . .	4 »
RONDELETIA speciosa (Hort.) . . . . .	2 »	STRELITZIA augusta (Th.) . . . . .	20 à 80	latifolia . . . . .	20 »
RUELLIA azurea . . . . .	1 50	humilis (L.) . . . . .	90 »	pinnatifida . . . . .	25 »
formosa (Andr.) . . . . .	1 50	imperialis . . . . .	10 à 30	YUCCA spec. de la Havanne . . . . .	1 50
cristata (Andr.) . . . . .	2 »	reginæ (Ait.) . . . . .	6 à 15 »	Une collection de 25 plantes bien as-	
varians (Vent.) . . . . .	2 »	spathulata, vera . . . . .	3 »	sorties à notre choix. Eine Samm-	
SACCHARUM officinarum (L.) . . . . .	5 »	SWEETENIA Mahagoni . . . . .		lung von 25 Sorten, gut assortirt . . . . .	25 »
SAPINDUS indica (Poir.) . . . . .	10 »	TACCA phalifera (Bojer) . . . . .		ZEPHYRANTHUS candida (Henb.) . . . . .	1 50
SCHOTIA latifolia (Jacq.) . . . . .	6 »	TACSONIA molissima . . . . .		grandiflorus (Lindl.) . . . . .	1 50
speciosa (Jacq.) . . . . .	2 à 4 »	THALIA dealbata? an spec. nova. Ma-			
SINNINGIA guttata (Lindl.) . . . . .					

## CYCADEÆ, PALMEÆ ET PANDANEÆ.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr.</i>	<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr.</i>	<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr.</i>
ARECA pinanga . . . . .	50 à 60	Cocos chilensis. Jubea spectabilis . . . . .	15 à 30	LATANIA rubra . . . . .	60
rubra (Boyr.) Euterpe globosa . . . . .	10 à 15	flexuosa . . . . .	60	OREODOXIA acuminata . . . . .	10
ATALEA COHUNE (Mart.), jeune		Lapidea . . . . .	45	regia . . . . .	5 à 20
plante . . . . .	100	oleracea . . . . .	25	PALMIER nouveau de l'Honduras . . . . .	60 à 100
BACTRIS setosa . . . . .	10 à 30	species N° 1., c. . . . .	150	PANDANUS amaryllifolius . . . . .	10 à 25
flavisipina . . . . .	15 à 20	CORYPHA AUSTRALIS, forte plante,		graminifolius . . . . .	2 à 15
BRAHIA DULCIS (Mart.), très-fort,		pétioles des feuilles de 1 <sup>m</sup> 50 <sup>c</sup> de		inermis . . . . .	30
un exemplaire magnifique . . . . .	400	long, magnifique . . . . .	500	pygmeus . . . . .	20 à 60
CALAMUS Draco (Willd.) . . . . .	70	Miraguam, Copernicia Miraguama,		utilis . . . . .	25 à 130
CARLUDOWIGIA angustifolia . . . . .	10 à 25	charmante espèce . . . . .	20 à 25	PHOENIX dactilifera . . . . .	3 à 25
latifolia . . . . .	10 à 30	CYCAS circinalis . . . . .	30 à 60	PINANGA latisecta . . . . .	30
palmata . . . . .	10 à 20	revoluta . . . . .	10 à 80	SABAL Adansonii . . . . .	3 à 15
CARYOTA urens (Linn.) . . . . .	35	species N° 1 . . . . .	100	SAGUS farinifera . . . . .	100
CERATOZAMIA Mexicana . . . . .	30 à 50	N° 2 . . . . .	100	ZALACCA asamica . . . . .	30 à 40
CHAMÆDorea elegans . . . . .	80 à 100	DIPLOTENIA MARTINICENSIS très-		ZAMIA horrida . . . . .	40 à 200
elatior . . . . .	20 à 30	fort . . . . .	120	integrifolia . . . . .	80
scandens . . . . .	15	ELAIS guienensis . . . . .	15	lanuginosa . . . . .	40 à 100
Schiedeana . . . . .	5 à 15	ELATE sylvestris . . . . .	20 à 25	muricata . . . . .	10 à 20
simplicifrons . . . . .	200	EUTERPE caraibea . . . . .	4	pumila . . . . .	40
CHAMÆROPS excelsa (Thunb.) . . . . .	10 à 30	FULCHIRONIA senegalensis. Phoenix spi-		pungens . . . . .	40 à 100
humilis (Linn.) . . . . .	3 à 15	nosa? . . . . .	50 à 150	spiralis . . . . .	25 à 60
histris (Fras.) . . . . .	15 à 30	GUILIELMA speciosa . . . . .	80	tridendata . . . . .	30 à 70
Palmetto (Mich.) . . . . .	15 à 30	LATANIA chinensis, très-forte . . . . .	500		

## FILICES.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>	<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>	<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>
ACROSTICHUM aleicorne (Sw.) . . . . .	2 »	ASPIDIUM falcatum (Sw.) . . . . .	2 »	CHELANTHES tomentosus . . . . .	1 »
* aureum (L.) . . . . .	2 50	* foeniscei . . . . .	2 »	viscosa . . . . .	2 »
conforme . . . . .	4 »	† fragile . . . . .	1 »	CHRYSTOPTERIS lepidopoda . . . . .	3 »
* ADIANTUM assimile (Sw.) A. tigrinum		patens . . . . .		spherodocarpa . . . . .	3 »
(Labil.) . . . . .	3 »	viviparum? . . . . .		CYPOTIUM SCHIEDEI, magnifique	
† capillus veneris . . . . .	1 »	† ASPLENIUM Adiantum nigrum . . . . .	» 50	fougère en arbre . . . . .	10 à 50
concinnum (H.) . . . . .	1 50	biserratum (Presl.) . . . . .	2 »	† CYSTOPTERIS fragiles (Desu.) . . . . .	1 50
curvatum . . . . .	2 »	† germanicum (Weis.) . . . . .	1 »	DAVALLIA canariensis . . . . .	1 50
formosum (R. Br.) . . . . .	1 50	furcatum (Thunb.) . . . . .	3 »	DICKSONIA Davallioides . . . . .	5 »
Moritzianum . . . . .	3 »	† Ruta muraria (Lin.) . . . . .	1 »	pilosiuscula . . . . .	2 »
† pedatum . . . . .	1 »	† septentrionale (Sw.) . . . . .	1 »	rubiginosa . . . . .	1 50
pubescens (Schk.) . . . . .	1 »	† trichomanes (L.) . . . . .	» 50	DIPLAZIUM decussatum? . . . . .	4 »
* tenerum (Sw.) . . . . .	2 »	† ATHYRIUM filix femina (Roth.) . . . . .	1 »	* DOODIA aspera (R. B.) . . . . .	1 50
* trapeziforme (L.) . . . . .	3 »	BLECHNUM glandulosum . . . . .	1 50	* distans . . . . .	2 »
* ALONTODIA umbrosa . . . . .	3 »	* gracile (Kaulf.) . . . . .	1 50	lupulata? . . . . .	1 50
ANEIMIA collina (Radd.) . . . . .	2 »	* lanceolatum (Rud.) . . . . .	2 »	rupestris . . . . .	» 50
ANAGRAMMA leptophylla . . . . .	2 »	CAMPILONEURUS decurrens . . . . .	10 à 20	* GYMNOGRAMME chrysophylla (B.) . . . . .	3 »
† ASPIDIUM aculeatum . . . . .	1 »	CEROPTERIS sulphurea . . . . .	1 »	* calomelanos (Kaulf.) . . . . .	2 »
brassiliense (Willd.) . . . . .	1 50	* COENOPTERIS japonica (Thunb.) . . . . .	2 »	LYCOPODIUM alpinum (L.) . . . . .	1 »
* capense (Willd.) . . . . .	3 »	CHEILANTHES lentigera . . . . .	3 »	* apodum (L.) . . . . .	3 »
* cuneatum . . . . .	1 50	miconema . . . . .	3 »	brasiliense . . . . .	1 »
* exaltatum. Polypodium exaltatum		pteridioides . . . . .	1 »	cœsium, charmante plante, les feuil-	



<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>	<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>	<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>
<i>les sont à reflets azurés</i> . . . . .	5 »	* POLYPODIUM effusum (Sw.) . . . . .	2 »	Une collection de 10 espèces, à notre	
* LYCOPodium circinatum . . . . .	1 »	harpeoides . . . . .	3 »	choix. Eine Sammlung von 10 Sorten,	10 »
* cordifolium . . . . .	1 »	longifolium . . . . .	1 50	nach unserer Wahl. . . . .	
* denticulatum . . . . .	1 »	paradisæ (Willd.) . . . . .	1 »	<i>Les espèces de serre chaude convien-</i>	
† selago . . . . .	» 50	† rhæticum (Linn.) . . . . .	2 »	<i>nent bien dans un local où l'on cultive</i>	
† selaginoides . . . . .	1 »	trifoliatum (Linn.) . . . . .	2 »	<i>les Orchidées des pays chauds. Leurs</i>	
* stoloniferum (Sw.) . . . . .	1 »	vacillans . . . . .	3 »	<i>feuillages déliés se marient d'une ma-</i>	
MARGINARIA dimorpha. <i>Polypodium di-</i>		† vulgare (Linn.) . . . . .	» 50	<i>nière très-agréable avec les formes lar-</i>	
<i>morphum</i> . . . . .	3 »	* PTERIS arguta (Willd.) . . . . .	3 »	<i>ges et vigoureuses des dernières.</i>	
MICROSORUS irregularis . . . . .	2 »	* baurita . . . . .	6 »	<i>Les espèces marquées d'un * peuvent</i>	
† NEPHRODium dilatatum (Desv.) . . . . .	1 »	* chrysocarpa . . . . .	» 50	<i>être cultivées en serre tempérée. Celles</i>	
† filix mas. (Desv.) . . . . .	1 »	* crenata (L.) . . . . .	2 »	<i>marquées d'une † sont pour la pleine</i>	
† Oreopteris (Desv.) . . . . .	1 50	* falcata (R. B.) . . . . .	0 »	<i>terre. Celles sans marques doivent être</i>	
* tuberosum . . . . .	1 »	* flexuosa . . . . .	2 »	<i>cultivées en serre chaude.</i>	
NIPHOBOLUS chinensis . . . . .	5 »	* hastata . . . . .	1 »	<i>Die sich im warmen cultivirende eignen sich</i>	
rupestris . . . . .	3 »	* leptophylla (Sw.) . . . . .	3 »	<i>hauptsächlich zur Vermischung mit den tropi-</i>	
NOTOCHLENA pumila . . . . .	1 50	* longifolia . . . . .	2 »	<i>schen Orchideen; ihr zartes Laub macht einen</i>	
† ONOCLEA sensibilis . . . . .	1 »	* nemoralis (W.) . . . . .	2 »	<i>sehr angenehmen Contrast mit den kräftigen</i>	
† OSMUNDA interrupta . . . . .	5 »	* serrulata (Willd.) . . . . .	2 »	<i>Formen der Gektern.</i>	
† regalis . . . . .	1 »	stenophylla . . . . .	3 »	<i>Die mit * bezeichneten Sorten können im</i>	
† PHOROLOPUS crispus. <i>Pteris crispa</i>	2 »	† SCOLOPENDRIUM officinarum (L.) . . . . .	» 75	<i>temperirten Haus cultivirt werden. Die mit</i>	
* POLYPODIUM aureum (L.) . . . . .	1 »	† cristatum . . . . .	2 »	<i>† bezeichnet sind für in's freie Land. Die</i>	
† calcareum . . . . .	1 »	† undulatum . . . . .	1 »	<i>ohne Zeichen sollen im warmen Haus culti-</i>	
* crassifolium (W.) . . . . .	3 »	† STRUTHIOPTERIS germanica (W.) . . . . .	1 50	<i>virt werden.</i>	
† dryopteris (L.) . . . . .	1 »	* WOODWARDIA Onocleoides (Willd.) . . . . .	2 »		

## ORCHIDEÆ.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>	<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>	<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>
ACROPERA Loddigesii (Lindl.). <i>Maxil-</i>		EPIDENDRON ciliare (Willd.) . . . . .	8 à 10 »	macrochilum . . . . .	10 à 20
<i>laria galeata</i> (Lodd.) . . . . .	5 »	* cochleatum (L.) . . . . .	3 à 5 »	monieras . . . . .	10 à 20
luteola . . . . .	7 à 10 »	* latifolium . . . . .	10 »	* papilio (Lindl.) . . . . .	20 à 30
ANGRÆCUM distichum . . . . .	10 »	crassifolium . . . . .	» »	pumilum . . . . .	10 à 20
maculatum (Lindl.) . . . . .	5 »	cuspidatum (Lodd.) . . . . .	5 »	sciurus . . . . .	30 »
odoratissimum . . . . .	12 à 15	elongatum (Jacq.) . . . . .	2 »	Species de Mexique . . . . .	80 à 100
BIFRENNARIA atropurpurea. <i>Maxillaria</i>	5 à 8 »	polybulbon (Sw.) . . . . .	4 »	ONCIDIUM Species N° 3 de l'Honduras.	50 »
BLETIA gracilis (Lindl.) . . . . .	10 »	pygmeum . . . . .	» »	N° 4. . . . .	50 »
hyacinthina (R. Br.) . . . . .	3 »	species du Mexique . . . . .	34 »	S. H. du Brésil . . . . .	50 »
purpurea? . . . . .	20 »	ERA pubescens (Lindl.) . . . . .	10 »	* PERISTERIA Barkeri (Bale) . . . . .	10 à 20
verecunda (H. Kew.). <i>Limodorum</i>		floribunda . . . . .	15 »	* elata (Hook.) . . . . .	10 à 40
altum (Jacq.) . . . . .	4 »	rosea . . . . .	15 »	Species della Guera . . . . .	80 à 100
Woodforii . . . . .	30 »	stellata (Lindl.) . . . . .	10 »	* PHAJUS grandifolius (Lour.). <i>Limodo-</i>	
BOLBOPHYLLUM saltatorium . . . . .	15 à 20	GOMEZA recurva . . . . .	12 »	<i>rum Tankervillei</i> (W.) . . . . .	3 »
BRASSAVOLA glauca . . . . .	25 à 20	GONGORA atropurpurea (Hook.) . . . . .	15 »	PHOLIDOTA imbricata (Lindl.) . . . . .	4 »
venosa . . . . .	8 à 10 »	pallida . . . . .	15 »	* RENANTHERA coccinea (R. Br.) . . . . .	10 »
BRASSIA caudata . . . . .	8 à 12 »	GROBYA Amherstiae . . . . .	15 à 20	rosea? . . . . .	20 »
lanceana . . . . .	20 »	HARTWÆGIA purpurea . . . . .	6 à 10 »	RODRIQUEZIA Barkeri (B. R.) . . . . .	10 »
maculata . . . . .	10 »	* HOEMARIA discolor . . . . .	3 »	* SARCANTHUS rostratus (B. R.) . . . . .	8 »
BROUGHTONIA sanguinea . . . . .	20 »	* LÆLIA acuminata . . . . .	40 »	SCHOMBURGKIA crispa . . . . .	20 à 40
CALANTHE densiflora . . . . .	7 à 10 »	albida . . . . .	20 »	SOPHRONITIS cernua (B. R.) . . . . .	20 »
veratrifolia . . . . .	10 »	anceps (Lindl.). <i>Barkeriana</i> . . . . .	15 à 30	* STANHOPEA aurantia . . . . .	40 »
CATTLEYA citrina (Lindl.) . . . . .	20 »	* LIPARIS foliosa (L. ndl.). <i>CYMBIDIUM</i>		eburnea . . . . .	8 à 12 »
crispa (Lindl.) . . . . .	12 à 20	reflexum (R. Br.) . . . . .	15 »	grandiflora (Sw.) . . . . .	10 »
Forbesii (Lindl.) <i>isopetala?</i> . . . . .	5 à 10 »	* MAXILLARIA aromatica (Grah.) . . . . .	5 à 10 »	* insignis (B. M.) . . . . .	6 à 12 »
mossiæi . . . . .	20 »	decolor (Lindl.) . . . . .	10 à 15	* oculata (Sw.) . . . . .	6 à 15 »
piperita . . . . .	50 »	densa . . . . .	3 à 6 »	odoratissima . . . . .	20 »
CIRRHEA viridipurpurea (Lodd.) . . . . .	10 »	* Deppei (Lodd.) . . . . .	5 à 10 »	quadricornis . . . . .	35 »
CYMBIDIUM aloifolium (Sw.) . . . . .	5 à 8 »	* Harrisoniæ (Lindl.) . . . . .	6 à 8 »	saccata . . . . .	20 »
ensifolium (Sw.) . . . . .	2 »	pieta . . . . .	10 à 20	tigrina . . . . .	20 »
dependens (Bot. Cab.) . . . . .	20 »	punctata (Lodd.) . . . . .	5 »	Wardii . . . . .	15 à 25
purpuratum . . . . .	20 à 25	species ex Brass N° 1 . . . . .	50 »	* STENORRHYNCHUS speciosus (B. M.) . . . . .	
sinenses (Willd.) . . . . .	5 »	N° 3 du Mexique . . . . .	50 »	<i>Neottia speciosa</i> (Hook.) . . . . .	5 »
* CYPRIPEDIUM insigne (Wall.) . . . . .	3 à 5 »	squalens (R. Br.). <i>Dendrobium squa-</i>		TRICHOPELIA tortilis . . . . .	20 à 30
* purpuratum . . . . .	25 »	lens (R. Br.) . . . . .	3 »	VANILLA aromatica (H. K.) . . . . .	20 »
* venustum (Wall.) . . . . .	5 à 10 »	stapelioides (Lindl.) . . . . .	5 à 20 »	claviculata . . . . .	20 »
CYRTOCHILUM maculatum (Lindl.) . . . . .	» »	tenuifolia . . . . .	20 à 30	planifolia . . . . .	5 »
* CYRTOPODIUM Andersonii (R. Br.) . . . . .	20 à 30	tetragona (Lindl.) . . . . .	15 »	pomponia . . . . .	10 »
DENDROBIUM aggregatum (Lindl.) . . . . .	20 »	* NEOTTIA picta (Sims.) . . . . .	3 »	* ZYGOPETALUM crinitum (B. K.) . . . . .	15 »
Baringtonii . . . . .	» »	ODONTOGLOSSUM Cervantesii . . . . .	60 »	Makayi (B. M.) . . . . .	15 »
buxifolium? . . . . .	5 »	grande . . . . .	» »	* maxillaria (Sw.) . . . . .	10 à 20
cœrulescens (Wall.) . . . . .	» »	Lindleyii . . . . .	15 à 25	odoratissimum . . . . .	30 à 50
humile . . . . .	6 à 10 »	membranaceum . . . . .	20 à 30	* stenochylum (Sw.) . . . . .	10 »
moschatum . . . . .	» »	* ONCIDIUM ampliatus (Lindl.) . . . . .	20 »	<i>A notre choix, 20 espèces d'Orchidées.</i>	
nobile . . . . .	15 à 30	* altissimum (Sm.) . . . . .	6 à 10 »	<i>Nach unserer Wahl, 20 Sorten. . . . .</i>	50 »
Oncidioidis . . . . .	» »	* crispum (Lodd.) . . . . .	20 »	<i>Une chaleur de 12 à 15° Réaumur</i>	
Pierardi. <i>D. cuculatum</i> . . . . .	5 à 10 »	Cebolella . . . . .	1 à 2 »	<i>suffit pour les espèces marquées d'un *.</i>	
* pulchellum (Roxb.) . . . . .	3 à 10 »	flexuosum . . . . .	10 à 20	<i>Eine Wärme von 12 bis 15 Grad Reaumur</i>	
* speciosum (Sm.) . . . . .	5 »	Harrisonianum (Lindl.) . . . . .	20 »	<i>ist hinlänglich für die mit * bezeichneten Arten.</i>	



# PLANTES DE SERRE TEMPREE ET D'ORANGERIE. — Orangerie- und Kalthaus- Pflanzen.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>	<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>	<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>
ACACIA alata (DC.) . . . . .	1 »	ABRUTUS Milleri (Don.) . . . . .	4 »	AZALEA indica Wandesi . . . . .	1 50
Berteriana (Spr.) . . . . .	1 à 3 »	unedo . . . . .	2 »	Wardi . . . . .	2 »
biflora (R. Br.) <i>A. hastulata?</i> . . . . .	1 50	ARISTOLELIA Maqui (Hérit.) <i>Cornus chi-</i>		Youngii . . . . .	1 à 2 »
chrysobotrya (Meis.) . . . . .	10 »	lensis Molin. . . . .	3 »	Rhododendroides . . . . .	3 »
cuneata (Renth.) . . . . .	2 »	ARDISIA japonica . . . . .	1 à 4 »	Sinensis . . . . .	2 à 4 »
cyanophylla (Renth.), Ac. Swanri-		ASTELIA Banksii . . . . .	1 à 4 »	<i>Une collection de 24 variétés à notre</i>	
ver (Hort.) . . . . .	8 »	ASTER moschatus? . . . . .	1 50	<i>choix. Eine Sammlung von 24 Sorten</i>	
dealbata (Link.) <i>A. affinis</i> (Sweet.)	2 »	AZALEA INDICA (L.)		<i>nach unserer Wahl . . . . .</i>	
Esterhazy . . . . .	1 50	Rhododendron indicum (Sw.)		<i>Une collection d'Azalea indica, en 12</i>	
decurrens (Willd.) . . . . .	1 à 2 »	alba . . . . .	1 à 3 »	<i>variétés, à notre choix. Eine Samm-</i>	
elata (Greh.) . . . . .	10 »	plena . . . . .	1 à 3 »	<i>lung indischer Azaleen, in 12 Sorten,</i>	
floribunda (Willd.) . . . . .	1 »	Aitoni . . . . .	2 »	<i>nach unserer Wahl . . . . .</i>	
frondosa (Willd.) . . . . .	4 »	ardens nova . . . . .	2 »	VARIÉTÉS EN MÉLANGE.	
glaucofolia <i>A. cultroformis</i> . . . . .	5 »	atropurpurea . . . . .	1 à 2 »	<i>Plantes de moyenne force, le 100.</i>	
heterophylla . . . . .	3 »	atrorubens . . . . .	1 50	<i>fortes en boutons, »</i>	50 »
latifolia (Desf.) . . . . .	1 50	augusta . . . . .	1 à 2 »	<i>très-fortes en boutons, »</i>	70 »
linearis (B. M.) . . . . .	1 50	aurantiaca duplex . . . . .	2 à 4 »	BÆCKEA camphorata (R. Br.) . . . . .	1 »
linifolia (Willd.) . . . . .	2 »	grandiflora . . . . .	1 à 2 »	BANKSIA armata . . . . .	5 »
longifolia glauca . . . . .	18 »	splendens . . . . .	4 50	australis (R. Br.) . . . . .	5 »
Lophanta (Willd.) . . . . .	1 à 4 »	bicolor . . . . .	1 à 3 »	collina (R. Br.) . . . . .	4 »
lunata nova . . . . .	4 »	candida . . . . .	1 »	cuneifolia (Wendl.) . . . . .	5 »
marginata (R. Br.) . . . . .	1 50	candidissima . . . . .	1 50	Cunninghami (Sieb.) . . . . .	4 »
mucronulata (Mak.) . . . . .	9 »	carnea floribunda . . . . .	1 à 2 »	denticulata (DC.) . . . . .	3 »
paradoxa (DC.) . . . . .	2 »	superba . . . . .	1 à 2 »	Dryandroides (Baxt.) . . . . .	15 à 25
pinifolia (Hortul.) . . . . .	1 50	coccinea speciosa . . . . .	1 à 2 »	ericæfolia (L. F.) . . . . .	2 à 40 »
glauca? an spec. nova Swanriver	20 »	superba . . . . .	1 »	grandis (Willd.) . . . . .	8 à 40 »
platyptera . . . . .	2 à 6 »	cœrulescens . . . . .	1 à 2 »	ilicifolia . . . . .	5 à 10 »
prostrata (Lodd.) Diffusa (Ker.)	2 à 6 »	Crimson . . . . .	1 à 2 »	integrifolia (L. F.) . . . . .	4 »
pubescens . . . . .	3 »	Cunninghami . . . . .	1 à 2 »	latifolia (R. Br.) . . . . .	5 »
pulchella (R. Br.) . . . . .	2 »	Danielsi . . . . .	1 à 5 »	littoralis (R. Br.) . . . . .	6 »
speciosa nova . . . . .	6 »	Dark Crimson . . . . .	1 à 3 »	marceces (R. Br.) . . . . .	4 »
robusta? . . . . .	4 »	purple . . . . .	1 à 3 »	marginata (Cav.) . . . . .	6 »
suaveolens (Willd.) . . . . .	2 »	elata plena . . . . .	1 à 2 »	oblongifolia (Cav.) . . . . .	4 »
subcœrulea (B. M.) . . . . .	6 »	Esquisite . . . . .	4 »	paludosa (R. Br.) . . . . .	5 »
truncata (Hortul.) . . . . .	2 »	Foordi . . . . .	2 »	præmorsa (Andr.) . . . . .	4 »
verticillata (Willd.) . . . . .	2 »	grandiflora . . . . .	1 50 à 2	serrata (L.) . . . . .	5 »
vestita (R. Br.) . . . . .	2 à 4 »	pallida . . . . .	1 50	speciosa (R. Br.) . . . . .	10 à 25
AGAPANTHUS foliis variegatis . . . . .	1 50	Hibbertii . . . . .	1 à 2 »	spinulosa (Sm.) . . . . .	5 »
AGAVE Americana (Linn.), petit. . . . .	1 50	hybrida . . . . .	1 à 2 »	verticillata (R. Br.) . . . . .	4 »
moyenne force . . . . .	20 »	ignescens . . . . .	1 à 2 »	BAUERA rubioides (Andr.) . . . . .	2 »
très-fort . . . . .	100 »	insignis pleno . . . . .	2 »	BEAUFORTIA decussata . . . . .	1 à 2 »
foliis variegatis, petit. . . . .	1 50	Jenneri . . . . .	3 »	rotundifolia . . . . .	3 »
moyenne . . . . .	20 »	lacteola superba . . . . .	2 »	splendens (Baxt.) . . . . .	1 50
foliis striatis . . . . .	3 à 8 »	light pink . . . . .	2 »	BERBERIS tenuifolia (Lindl.) . . . . .	5 à 20 »
virginica (Linn.) . . . . .	2 »	crimson . . . . .	1 à 3 »	trifoliata nova . . . . .	5 à 10 »
AGONIS MARGINATA . . . . .	4 »	purple . . . . .	2 »	BERZELIA lanuginosa . . . . .	2 à 3 »
ALOE arborescens (Mill.) . . . . .	3 à 30 »	lilacina aurantiaca . . . . .	1 50	BILLARDIERA fusiformis (Lab.) Sollya	
atrovirens (DC.) Haworthia marga-		superba . . . . .	1 à 2 »	heterophylla (Lindl.) . . . . .	1 50
ritifera (Haw.) . . . . .	1 50	macrantha . . . . .	1 à 3 »	BORONIA alata (Sm.) . . . . .	2 »
mitraeformis (Willd.) . . . . .	2 »	Mazeppa . . . . .	1 à 2 »	crenulata . . . . .	1 à 3 »
plicatilis? . . . . .	2 »	Mazoratti . . . . .	2 »	serulata (Sm.) . . . . .	3 »
Radula (Jacq.) . . . . .	1 50	mutabilis . . . . .	2 »	viminea . . . . .	2 »
variegata (Lin.) . . . . .	2 »	neriifolia rubra . . . . .	1 à 2 »	BOSSIA thymifolia (Hort.) . . . . .	1 »
virens (Haw.) . . . . .	1 50	splendens . . . . .	1 50 à 2	BOUVARDIA flava . . . . .	2 »
ALSTROEMERIA acutifolia (L. et O.) . . . . .	2 »	new white . . . . .	1 50	strigulosa . . . . .	1 à 1 50
aurea (Gr.) . . . . .	2 »	Orange pink . . . . .	2 »	BRACHYSEMA platyptera. Sontania Cel-	
DU CHILI, en plusieurs variétés . . . . .	2 »	phœnicea grandiflora . . . . .	2 à 3 »	sanica . . . . .	3 à 10 »
Pelegria (L.) . . . . .	1 50	pulchella . . . . .	1 à 2 »	undulatum . . . . .	1 50
psittacina (Lehm.) . . . . .	1 50	pulcherrima pallida . . . . .	1 50	BRUNIA imbricata (Wendl.) . . . . .	2 »
AMICIA Zygomeris (DC.) . . . . .	1 à 2 »	vera . . . . .	2 à 3 »	nodiflora . . . . .	3 »
ANAGALLIS lilacina grandiflora . . . . .	1 »	punicea . . . . .	1 50	BRUNSWIGIA Josephina (Ker.), forte	
philipsi . . . . .	1 50	purpurea nova . . . . .	2 à 5 »	plante . . . . .	30 »
superba . . . . .	1 »	grandiflora . . . . .	2 à 3 »	BUDDLEIA globosa . . . . .	3 »
ANIGOZANTHUS Lindeni . . . . .	6 »	Rawsoni . . . . .	1 50	heterophylla (B. fleg.) . . . . .	1 »
AMARYLLIS belladonna (L.) . . . . .	1 à 2 »	rotundifolia . . . . .	1 à 2 »	Lindleyana . . . . .	1 »
ARALIA crassifolia . . . . .	20 à 40	Salmon . . . . .	1 50	Madagascariensis (Vahl.) . . . . .	2 »
pinnata . . . . .	25 à 45	Skrimakerski . . . . .	1 50	BUMELIA tenax . . . . .	1 »
trifoliata . . . . .	10 à 20	Smithii coccinea . . . . .	1 50	BURCHELLIA capensis (R. Br.) . . . . .	1 à 3 »
ARAUARIA brasiliensis (Lamb.) . . . . .	3 à 40 »	elegans . . . . .	2 »	CALCEOLARIA. Une collection de 12	
<i>Plantes de graines de 30 centi-</i>		speciosa . . . . .	1 à 2 »	<i>belles variétés à notre choix . . . . .</i>	12 »
mètres . . . . .	10 »	speciosissima . . . . .	2 »	<i>Une collection de 12 variétés de se-</i>	
Cunninghami (Steud.), boutures	20 »	splendens . . . . .	2 »	<i>cond choix . . . . .</i>	9 »
excelsa (Ait.), boutures . . . . .	12 »	superba plena . . . . .	2 à 4 »	CALLISTACHYS Drummondi . . . . .	5 »
de graines . . . . .	100 à 200	Thomasii . . . . .	1 à 2 »	ovata (Sims.) . . . . .	1 50
imbricata (Bav.), de graines . . . . .	4 à 20 »	variegata . . . . .	3 »	elliptica (Vent.) . . . . .	1 50
ABRUTUS Andrachne (Willd.) . . . . .	2 »	venusta . . . . .	3 »	CALOTHAMNUS Baxteri . . . . .	4 »
canariensis (L.) . . . . .	2 »	Victoria . . . . .	2 »	clavata (M.) . . . . .	1 50
floribunda . . . . .	3 »	violacea superba . . . . .	2 »	longissima (Hort.) . . . . .	3 »
hybrida . . . . .	3 »	superba . . . . .	2 »	quadrifida (R. Br.) . . . . .	2 »
longifolia (Loid.) . . . . .	3 »				



<i>La pièce. Das Stück</i>	fr. c.
CALOTHAMNUS <i>Shoenophylla nova spec.</i>	5 »
<i>villosa (R. Br.)</i> . . . . .	1 50
<i>species nova Swanriver</i> . . . . .	30 »

### CAMELLIA.

Nous accordons une remise de 10 % pour toute demande de Camellias dépassant 50 fr., et 15 % pour celles dépassant 100 fr. Es wird eine Remise nachgelassen von 10 % von jeder Bestellung die sich über 50 Fr. beläuft; von 15 % von jeder die sich auf mehr als 100 Fr. beläuft.

Nous offrons en outre, à notre choix, 12 variétés de Camellias greffés de 2 ans. Ferner, nach unserer Wahl, geben wir ab: 12 Sorten 2jährige Zweige

20 variétés de Camellias greffés de 2 ans. 20 Sorten 2jährige Zweige. . . . . 24 »

40 variétés de Camellias greffés de 2 ans. 40 Sorten 2jährige Zweige. . . . . 45 »

Idem 80 variétés. Ebenfalls 80 Sorten. . . . . 100 »

Idem 80 variétés. Ebenfalls 80 Sorten. . . . . 210 »

Pour les plantes en boutons, on paiera un cinquième en sus. Für mit Knospen versehene Pflanzen wird ein Fünftel mehr bezahlt.

Camellias simples pour la greffe, de la force d'un tuyau de plume, le 100.

Einfache Camellien zum Zweigen, von der Stärke eines Federkiels, das 100 . . . . . 85 »

Idem plus faibles, le 100. Ebenfalls kleinere, das 100 . . . . . 70 »

Nous possédons en outre de belles pyramides et hautes tiges (celles marquées d'un \*), pour le prix desquelles on s'entendra par correspondance avec les amateurs. Wir besitzen eine Anzahl schöne große Pyramiden und hochstämmige Camellien (die mit \* bezeichnet), über dessen Preis wir uns schriftlich mit den Liebhabern verstehen werden.

CAMELLIA axillaris (A. B.) . . . . .	2 à 4 »
Euryoides (A. B.) . . . . .	1 3 »
rosea . . . . .	1 3 »
japonica alba fenestralis . . . . .	2 4 »
* alba plena (A. B.) . . . . .	1 3 »
* alba lutescens (A. B.) . . . . .	2 3 »
admirabilis <i>Adelaïde</i> . . . . .	2 3 »
agenorea <i>Adrian Lebrun</i> . . . . .	3 8 »
Alexandre le-Grand . . . . .	2 8 »
Allioni . . . . .	2 3 »
* althæflora. . . . .	2 3 »
* amabilis (A. B.) . . . . .	3 4 »
Amanda (Angresia). . . . .	4 6 »
Aminta (Sada). . . . .	» 20 »
* anemoneflora rosea (A. B.) . . . . .	2 3 »
* rubra . . . . .	2 3 »
* striata . . . . .	2 3 »
* APOLLO, nouvelle d'Italie . . . . .	2 5 »
argentea plena. . . . .	2 4 »
atra-Warratah nova . . . . .	2 4 »
atroviolacea . . . . .	3 5 »
* aurantiaca nova . . . . .	3 4 »
* Baggroni . . . . .	3 4 »
Baumanniana (A. B.) . . . . .	2 3 »
Beali Palmers, Beali, Leeana superbe . . . . .	3 4 »
Bedforthii (Whithini). . . . .	2 4 »
Belle Henriette . . . . .	3 5 »
Belle Nanette . . . . .	3 4 »
* Bellinia. . . . .	3 4 »
Berleziana (A. B.) . . . . .	» 3 »
Bianchi . . . . .	2 4 »
* Blaw . . . . .	3 4 »
Brochi. . . . .	» 2 »
Brookliana d'Amérique . . . . .	4 8 »
Browni . . . . .	» 3 »
* CALCIALI, nouvelle d'Italie . . . . .	2 10 »
* CAMPOMOLENTINA. . . . .	5 20 »
candidissima . . . . .	2 3 »
CANOVA . . . . .	» 10 »
* Caracioli (F. B.) . . . . .	6 7 »
* Carvelliana . . . . .	2 4 »
Chandleri (A. B.) . . . . .	2 5 »
China (A. B.) <i>Reves nova</i> . . . . .	2 3 »

<i>La pièce. Das Stück</i>	fr. c.
* CAMELIA jap. Climène (belle), F. R..	2 3 »
Cliveana (A. B.) . . . . .	2 5 »
colorata striata . . . . .	» 3 »
Colvilli . . . . .	» 3 »
Columbo. . . . .	3 5 »
compacta. . . . .	» 4 »
* conchiflora (Aglæe) . . . . .	2 3 »
conspicua . . . . .	2 3 »
corallina (A. B.) . . . . .	2 5 »
coronata. . . . .	» 3 »
Covanni . . . . .	» 8 »
Crimson perfection. . . . .	2 6 »
cruciata . . . . .	» 6 »
* Dalleni. . . . .	2 5 »
* Dallisch . . . . .	» 5 »
† DARIO . . . . .	5 10 »
* decora . . . . .	2 5 »
* DELAIRI (Aug. et Nap. Baumann), variété très-double obtenue de graines, premier choix	20 50 »
delecta . . . . .	2 3 »
* delicatissima . . . . .	2 4 »
depressa . . . . .	2 3 »
* Derbyana. . . . .	2 5 »
* Diana . . . . .	4 6 »
Diva Maria. . . . .	» 5 »
* Donckelari (A. B.) . . . . .	2 5 »
* Dorsetti . . . . .	» 2 »
Drummondii . . . . .	2 4 »
Duchezza Litta . . . . .	4 7 »
Duchesse de Nemours. . . . .	» 2 »
Dunlap's americana. . . . .	» 6 »
Dux Litta . . . . .	» 10 »
Eclipse ou Pressi, Prestons Eclipse (Regina Gallorum) . . . . .	2 à 3 »
egerstonia . . . . .	3 4 »
* elegantissima (A. B.) . . . . .	2 4 »
elata (Chandleri). . . . .	» 3 »
elegans nova . . . . .	» 3 »
Elisabeth imperiale. . . . .	2 4 »
* Elphinstonii (A. B.) . . . . .	2 3 »
Empereur d'Autriche . . . . .	15 20 »
* Epsomiana . . . . .	» 2 »
* excelsa (A. B.) . . . . .	3 4 »
cximia (vera) (A. B.) . . . . .	2 4 »
Feastii (M. Wilder's) . . . . .	10 20 »
fimbriata alba plena. . . . .	2 3 »
rubra . . . . .	4 6 »
* Fintelmanni. . . . .	» 2 »
flammea (A. B.) . . . . .	2 4 »
flammeola superba . . . . .	» 2 »
flavescens (alb. lutescens) . . . . .	2 4 »
florida rosea . . . . .	2 4 »
†* Floyi. <i>Grand Frédéric</i> . . . . .	» 4 »
Fordii . . . . .	» 4 »
formosa (B. A.), <i>formosissima</i> . . . . .	3 4 »
* Francfortensis. <i>Wellingtoni</i> . . . . .	2 3 »
fulgentissima . . . . .	3 5 »
Futting, Reawesi, Rozeanum. . . . .	2 4 »
gallica alba (A. B.) . . . . .	2 4 »
général Zighsi. . . . .	6 8 »
GERANDOI (nob.), nouvelle blanche, forme très-régulière, fleur très-grande . . . . .	» 50 »
* Ghittina . . . . .	3 5 »
* gigantea (A. B.) . . . . .	2 3 »
Gioja . . . . .	» 4 »
* Gilesi (Nancy Dawton). . . . .	2 3 »
* gloria mundi . . . . .	2 3 »
Goussoni. . . . .	» 3 »
Gozzi . . . . .	5 8 »
Grafton Lady . . . . .	3 » »
GREISSI (Aug. et N. Baumann). . . . .	4 10 »
* Graya nova (A. B.) . . . . .	3 6 »
* Griffini. . . . .	3 4 »
Grunelli . . . . .	2 3 »
Harrissonia . . . . .	» 3 »
Haylocki (Lokarl) . . . . .	2 3 »
heptangularis . . . . .	2 4 »
Hebertii (A. B.) . . . . .	2 4 »
Henchmannii (A. B.) . . . . .	» 2 »
Henri Favre . . . . .	2 5 »
* hexangularis. . . . .	2 3 »
hibiscus . . . . .	» 3 »

<i>La pièce. Das Stück</i>	fr. c.
CAMELLIA japonica Houdi . . . . .	» 10 »
humilis . . . . .	» 4 »
imbricata (A. B.) . . . . .	2 3 »
* albo pleno (A. B.), triomphans	
albo, albo picto . . . . .	2 3 »
imbricata spiralis. . . . .	4 5 »
* imperialis. . . . .	» 4 »
†* incarnata. . . . .	2 3 »
insignis albo (A. B.) . . . . .	» 4 »
involuta (myrtifolia) . . . . .	2 3 »
JAHNII (Aug. et N. Baumann). . . . .	» 20 »
Kentii. . . . .	» 4 »
Kings royale, Clussi (A. B.) . . . . .	» 3 »
* Kookia. . . . .	2 4 »
Lamberti. . . . .	» 4 »
lactea . . . . .	» 3 »
Lancesuriana . . . . .	» 5 »
Lechit. . . . .	» 4 »
Leeana superba (A. B.) . . . . .	3 4 »
Lemairi . . . . .	3 4 »
Leopoldina . . . . .	» 4 »
L'infanto. . . . .	» 4 »
Loudon . . . . .	4 10 »
* lucida (A. B.) . . . . .	3 4 »
Lussiana . . . . .	» 3 »
Macdonaldi. . . . .	» »
magniflora plena . . . . .	» 4 »
maliflora. <i>Sasangua roseo plena</i> , multiflora . . . . .	2 3 »
Manotti . . . . .	2 4 »
Manzoni . . . . .	3 5 »
Maometti. . . . .	2 4 »
Maria Dorotheo (F. B.) . . . . .	2 3 »
MARIE PADILLA, nouvelle d'Italie. . . . .	3 10 »
* marmorata (A. B.) . . . . .	2 3 »
Marshall Wilder's aurora (F. B.). . . . .	2 3 »
Martha . . . . .	» 50 »
medicea . . . . .	2 4 »
† Melinetti . . . . .	» 2 »
Melissa . . . . .	» 5 »
Merilli. . . . .	» 5 »
Micantica . . . . .	» 4 »
Milleri. . . . .	3 6 »
mira . . . . .	2 3 »
M <sup>ss</sup> Gunnel. . . . .	15 30 »
monstrosa . . . . .	3 4 »
* Monti. . . . .	2 4 »
Montironi . . . . .	» 3 »
moreana . . . . .	» 3 »
mutabilis, Traversi (A. B.). . . . .	3 5 »
MUZIANA (A. et N. Baumann), nouveau de semis, superbe. . . . .	» 40 »
myrtifolia (A. B.) . . . . .	2 4 »
Napoléon (de France). . . . .	» 6 »
Nassiniana . . . . .	2 3 »
NEOBORACENSIS, nouvelle d'Amérique . . . . .	2 10 »
new-imported (A. B.). China. . . . .	2 3 »
nivea . . . . .	» »
NOACKI (Aug. et N. Baumann), nouveau semis superbe . . . . .	» 20 »
* nobilissima (A. B.). Waddi (A. R.) . . . . .	2 3 »
Norma. . . . .	» 10 »
ochroleuca . . . . .	» 4 »
Oleifera latifolia . . . . .	» 3 »
Omboni . . . . .	» 5 »
Orlando . . . . .	4 5 »
* ornata (A. B.) . . . . .	2 3 »
Oudiniana . . . . .	2 5 »
Ourselli . . . . .	5 10 »
†* Oxoniensis (A. B.) . . . . .	2 3 »
* pæoniflora rosea (A. B.) . . . . .	2 3 »
pallida nova. . . . .	3 4 »
* Palmers rosea . . . . .	2 3 »
Park's striped (Parksii) . . . . .	2 3 »
Partheniana . . . . .	» 4 »
* Pawhallow . . . . .	5 20 »
Pawlikowski rosea . . . . .	2 3 »
perceya (A. B.) . . . . .	2 3 »
Peregalli . . . . .	» 5 »
Pénélope . . . . .	» 5 »
* PERCYVALII, nouv. d'Amérique . . . . .	5 10 »



<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr.	c.
CAMELLIA jap. Presley's victoria, <i>Queen Victoria</i> . . . . .	5	10 »	CASUARINA nana (Sieber.) . . . . .	3	»	CITRUS Limon. stricta C. buxifolia . .	2	»
* pictorum roseum . . . . .	4	15 »	stricta (Willd.) . . . . .	2	»	trifoliata . . . . .	3	»
Pomponia alba . . . . .	2	3 »	species nova . . . . .	10	»	Une collection de 25 variétés diverses,		
* rosea . . . . .	2	3 »	CEANOTHUS azureus (Desf.) . . . . .	2	»	à notre choix. Eine Sammlung von 25		
Porta . . . . .	»	4 »	divaricatus . . . . .	1	»	verschiedenen Sorten, nach unserer Wahl.	30	»
præcellentissima (A. B.) . . . . .	4	5 »	CELASTRUS buxifolia . . . . .	1	50	20 variétés en greffes de 2 ans, au		
PRATOMOLENTINA . . . . .	»	20 »	edulis . . . . .	2	»	choix des amateurs. 20 Sorten 2jäh-		
Preston Eclipse (A. B.) . . . . .	2	3 »	CELSIA grandiflora (Hort.) . . . . .	1	50	riger Stämme, nach der Wahl der Lieb-		
Prince d'Orange . . . . .	3	5 »	CERATONIA siliqua (L.) . . . . .	1	50	haber . . . . .	40	»
Princesse Amélie . . . . .	3	5 »	CESTRUM grandiflorum (Hort.) . . . . .	1	50	CHIRITA chinensis . . . . .	2 à 4	»
pulcherrima striata . . . . .	3	5 »	roseum (H. B.) . . . . .	1	50	CLETHRA arborea (Ait.) . . . . .	1	50
Pullesia . . . . .	2	4 »	CHAMOEROSTENUM polyanthum? . . . . .	1	»	foliis variegatis . . . . .	1	50
punctata major ( <i>invincible</i> ) . . . . .	2	3 »	CHASMONE Andrewsiana (E. M.) . . . . .	1	»	maderiensis . . . . .	1	50
Pyroleana . . . . .	4	8 »	CHIRONIA Fischeri . . . . .	1	»	mexicana . . . . .	3	»
Queen Victoria . . . . .	5	10 »	jasminoides (L.) . . . . .	1	50	CLIANTHUS puniceus (Soland.) . . . . .	1 à 3	»
* RADAELLII . . . . .	10	20 »	linoides (L.) . . . . .	1	»	CORREA alba (DC.) . . . . .	1	»
* Regina Gallorum . . . . .	2	3 »	trinervis (Lin.) . . . . .	1	50	Jeunes plantes propres à la greffe.		
* Regina (Kings.) . . . . .	3	» »	CHORIZEMA ilicifolium (Labill.) . . . . .	1	»	Junge Pflanzen zur Vermehrung		
Reigneri . . . . .	3	4 »	triangularis . . . . .	5	»	tauglich, 12 plantes . . . . .	6	»
* Revini . . . . .	2	3 »	varium . . . . .	1	50	ampulacea . . . . .	6	»
Richardtsoni (d'Amérique) . . . . .	»	5 »	novum . . . . .	1	50	Grevilii . . . . .	1	»
* Rives nova (China) . . . . .	2	3 »	CINERARIA. Une collection de pre-			Harrisoni . . . . .	2 à 4	»
Rose Agathe . . . . .	5	10 »	mier choix de 12 variétés bien as-			Lindleyana . . . . .	8	»
rosæflora . . . . .	2	3 »	sorties. Eine Sammlung erster Aus-			longiflora . . . . .	1 à 4	»
Rosamundi . . . . .	4	5 »	wahl von 12 Sorten . . . . .	12	»	nec plus ultra . . . . .	6	»
Rossi . . . . .	»	2 »	Une collection de deuxième choix.			quadrangulæis . . . . .	1 à 4	»
Rouvroy . . . . .	»	» »	Eine Sammlung von zweiter Auswahl	6	»	rosea multiflora . . . . .	2 à 4	»
rubicunda . . . . .	»	3 »	CITRUS aurantiacum chin. longifol. . . . .	3	»	rubra major . . . . .	2	»
* plena (A. B.) . . . . .	2	3 »	nobilis, Or. douce . . . . .	2 à 8	»	rufa (Gœrtn.) . . . . .	1	»
* rubricaulis variegata . . . . .	3	4 »	latifolia foliis variegatis . . . . .	2	»	speciosa (And.) . . . . .	1 à 2	»
* Sacco limatensis . . . . .	3	8 »	longifolia variegatis . . . . .	2	»	speciosissima . . . . .	2 à 4	»
* SARAH FROST, d'Amérique . . . . .	»	10 »	lunatum (Ris.), Or. ture . . . . .	2	50	Stockwelliana . . . . .	2	»
Scottiana . . . . .	2	3 »	mandarina, C. sinensis . . . . .	2 à 4	»	tricolor . . . . .	8	»
* sericea . . . . .	2	3 »	mandarina minor . . . . .	2 à 3	»	viridiflora (Andr.) . . . . .	1 à 2	»
* Sieboldii (imbricat. tricol.) . . . . .	3	4 »	mandarina à feuilles de myrthe . . . . .	2	50	CORONILLA glauca foliis variegatis . . . . .	1	50
* Sinica . . . . .	»	3 »	Marocco . . . . .	2	»	grandiflora . . . . .	2	»
Smith's grandiflora . . . . .	2	4 »	Otahitense (Ris.) . . . . .	1 à 3	»	CRATEGUS glabra . . . . .	1	50
sterilis . . . . .	1	50 à 3 f.	Pomma rosa . . . . .	2	»	serratifolia . . . . .	2	»
striata . . . . .	3	à 4 »	Portugallo vaniglia . . . . .	2	»	species nova à feuilles persistantes,		
supina . . . . .	2	4 »	Senz agro . . . . .	2	»	très-grande et belle plante . . . . .	4	»
Sweetiana (A. B.) . . . . .	2	5 »	Tangerin . . . . .	3	»	CROTALLARIA elegans . . . . .	1	50
* Taylori . . . . .	3	5 »	Tipain . . . . .	3	»	CUPHEA miniata . . . . .	1	»
* Theresiana (A. B.) . . . . .	2	5 »	australis . . . . .	2 à 3	»	platicentra . . . . .	2	»
Teutonia . . . . .	4	10 »	Bergamia melarosa . . . . .	2 à 3	»	scabrida (H. B.) . . . . .	1	50
* Traversi mutabilis . . . . .	3	5 »	bastardo . . . . .	2 à 3	»	strigulosa . . . . .	1	»
Triphosa lactea (F. B.) . . . . .	2	4 »	flore pleno . . . . .	2	»	viscosa . . . . .	1	»
* triumphans . . . . .	3	4 »	merveille du Pérou . . . . .	3	50	CUSONIA spicata (Thun.) . . . . .	4	»
Turnbulli . . . . .	3	6 »	Bigaradia crispifol. <i>Bouquetier</i> . . . . .	2	»	thyrsiflora (Thun.) . . . . .	3	»
* variegata chinensis . . . . .	3	6 »	Japonica . . . . .	3	»	CYCLAMEN africanum . . . . .	4 à 20	»
* plena (A. B.) . . . . .	2	3 »	foliis aureo variegatis . . . . .	3	»	intermedium . . . . .	3	»
* venusta (A. B.) . . . . .	2	4 »	melangola de la Chine à larges			neapolitanum (Ttn.) . . . . .	1	50
* verecunda . . . . .	6	10 »	feuilles . . . . .	3	»	persicum (Mill.) . . . . .	1	»
* versicolor variegata . . . . .	3	4 »	dolce . . . . .	2 à 3	»	CYTUSUS elegans . . . . .	1	»
atroviolacea . . . . .	»	5 »	stellata riccia . . . . .	2 à 3	»	DACRIDIUM cupressiforme . . . . .	5 à 40	»
Victor Hugo . . . . .	»	7 »	myrtifolia (Ris.) . . . . .	2 à 8	»	elatum (Wall.) . . . . .	20	»
Victoria Antverbiensis . . . . .	»	3 »	foliis variegatis . . . . .	2 à 8	»	spicatum . . . . .	2 à 6	»
virginica . . . . .	5	6 »	hystrix (DC.) . . . . .	2 à 4	»	DAIS cotinifolia (L.) . . . . .	1	50
Wardii . . . . .	2	3 »	Limetta Pomum Adami. Cedra des			DAMARA australis . . . . .	20 à 200	»
WASHINGTONIANA, nouvelle			juifs . . . . .	2 à 4	»	DAPHNE Aucklandi . . . . .	4	»
d'Amérique . . . . .	8	15 »	scanellatone . . . . .	2 à 3	»	Cneorum maximum . . . . .	1 à 1	50
* Watsoniana . . . . .	2	3 »	Limonium balotinum (Ris.) . . . . .	2	»	foliis variegatis . . . . .	2	»
Welbanksiana heptangularis . . . . .	3	4 »	Capo d'Aro . . . . .	2	»	collina (W.) . . . . .	1 à 2	»
* Weymariana . . . . .	2	3 »	cardinalisque . . . . .	2	50	Delahayana . . . . .	3	»
* Wirkfeld . . . . .	4	10 »	chinense . . . . .	2 à 3	»	Fioni, Daphne Delphini . . . . .	1 à 3	»
* Woodsii (A. B.) . . . . .	3	6 »	dolce . . . . .	2 à 3	»	indica foliis variegatis . . . . .	1 à 2	»
* Kissi (DC.) . . . . .	»	2 »	foliis integris . . . . .	2 à 3	»	flore rubra . . . . .	4	»
* reticulata (Lindl.) . . . . .	4	6 »	fructu maxim. obl. . . . .	2 à 3	»	neapolitana (Lodd.) . . . . .	1 à 2	»
Sassangua rosea plena . . . . .	2	3 »	grossa della regina . . . . .	3	»	odora (Thun.) . . . . .	3	»
* nepalensis . . . . .	»	4 »	longo puncto. C. <i>unbellicato</i> . . . . .	2 à 4	»	pontica (Spr.) . . . . .	1	»
* oleifera (Abel) . . . . .	2	3 »	incomparabile . . . . .	2 à 4	»	DATURA arborea (L.) <i>Brugmansia can-</i>		
* latifolia . . . . .	2	3 »	moscardina . . . . .	2	»	dida (Pers.) . . . . .	1 à 6	»
Thea Bohea . . . . .	2	3 »	à suc noir . . . . .	2	»	DAVIESIA quadrilatera . . . . .	6	»
camellioides . . . . .	»	3 »	monstrosum . . . . .	2 à 3	»	DIOSMA alba (DC.) <i>Coleonema alba</i>		
sassangua . . . . .	»	3 »	Peretto domingensis . . . . .	2	50	(B. W.) . . . . .	1	50
viridis (Green Thea) . . . . .	2	4 »	Pompelmus Chadec. à feuilles ve-			angustifolia (Hort.) <i>Coleonema pul-</i>		
CAMPANULA Barkeri? . . . . .	»	1 »	lues . . . . .	2 à 3	»	chra (Hook.) . . . . .	2	»
fragilis Cyril . . . . .	»	1 »	crispatus C. decum . . . . .	3	»	cordata (Hort.) . . . . .	1	»
laciniata (Lin.) . . . . .	»	1 »	des colonies . . . . .	2 à 3	»	dioica . . . . .	2	»
verna? . . . . .	»	1 »	de Portorico, nouvelle variété . . . . .	5	»	formosa . . . . .	1	50
CANDOLLEA cuneiformis (Labill.) . . . . .	»	1 »	rubescens . . . . .	2 à 4	»	fragrans . . . . .	1	50
Cunninghami . . . . .	»	2 »	saladina (Ris.) Cédraier de Saint-			grandiflora . . . . .	1	50
CASSIOPE tetragona (G. Don.) <i>Andro-</i>			Jérôme . . . . .	2 à 4	»	pupurea (Hort.) . . . . .	1	50
<i>meda tetragona</i> . . . . .	»	5 »	striatum, scanellatum . . . . .	2 à 3	»	umbellata (W.) . . . . .	2	»
			striatum foliis varieg. . . . .	3	»	uniflora (Schrud.) . . . . .	1 à 3	»



La pièce. Das Stück.		fr. c.	La pièce. Das Stück.		fr. c.	La pièce. Das Stück.		fr. c.
DIPTOLENA Dampierii . . . . .		3 »	ERICA nigricans (Lodd.) . . . . .		3 »	FUCHSIA Joan of Arc (Miellez) . . . . .		3 »
DODONEA pinnata (Sm.) . . . . .		1 à 4 »	oppositifolia (A. H.) . . . . .		2 »	Juno . . . . .		1 50
DOMBEYA Erythroxylon (Willd.) . Mel-			ornata . . . . .		2 »	London's rival (G. Smith.) . . . . .		1 50
hania Erythroxylon . . . . .		3 »	ottois (Hort.) . . . . .		1 »	magnet (Regel's) . . . . .		2 »
DORIANTHES excelsa (R. R.), très-fort.		10 à 25	passerina (L.) . . . . .		2 »	magniflora . . . . .		1 »
DROEMANDRA floribunda . . . . .		1 »	persoluta alba (L.) . . . . .		2 »	Napoléon (Miellez) . . . . .		2 50
DRYANDRA floribunda (R. Br.) . . . . .		10 »	perspicacea . . . . .		3 »	NOBILISSIMA . . . . .		2 »
formosa (R. Br.) . . . . .		20 »	Pluckeneti . . . . .		2 »	Prima Donna (Regel's) . . . . .		1 50
longifolia (R. Br.) . . . . .		20 »	polytrichifolia (Salisb.) . . . . .		1 »	Prince of Wales . . . . .		1 »
nervosa (R. Br.) . . . . .		25 »	præstans (Andr.) . . . . .		2 »	Queen Victoria . . . . .		3 »
nivea (R. Br.) . . . . .		10 »	pubescens major . . . . .		1 »	racemiflora . . . . .		1 »
tenuifolia (R. Br.) . . . . .		15 »	pulchella (Andr.) . . . . .		2 »	Rebecca . . . . .		2 »
EDWARDSIA grandiflora (Salisb.) . . . . .		1 à 3 »	ramentacea . . . . .		3 »	Robert . . . . .		» 50
microphylla . . . . .		1 50	regerminans (L.) . . . . .		1 50	Rogersiana . . . . .		1 50
ELICHRYSUM argenteum (Th.) . . . . .		2 »	rubens (Andr.) . . . . .		2 50	Rosa mundi . . . . .		1 »
fulgidum (Willd.) . . . . .		1 50	rubra calix . . . . .		2 »	scaramouche . . . . .		1 50
proliferum Phænocoma proliferum			Sebana carnea . . . . .		3 »	Venus victrix . . . . .		1 »
(Don.) . . . . .		1 à 3 »	lutea . . . . .		2 »	Wal-Taylor . . . . .		2 »
spectabile . . . . .		2 »	sexfaria . . . . .		2 à 3 »	White Smith . . . . .		2 »
EMBOTHRIUM speciosissimum . . . . .		10 à 50	socciflora (Salisb.) . Sebana viridis			Woodsi . . . . .		1 »
ENKIANTHUS longifolius . . . . .		8 à 10 »	(A. H.) . . . . .		4 »	Nous offrons en outre, à notre choix :		
quinqueflorus (Lour.) . . . . .		3 à 12 »	speciosa (Andr.) . . . . .		2 »	Une collection de FUCHSIA de 12 esp.		6 »
undulatus . . . . .		8 à 15 »	sulphurea . . . . .		2 »	» » de 24 »		15 »
EPACRIS amabilis . . . . .		8 »	Tetralix speciosa (Hort.) . . . . .		1 50	» » de 30 »		20 »
campanulata (Lodd.) . . . . .		2 à 6 »	tortuosa (Lodd.) . . . . .		2 50	Au choix des amateurs :		
alba . . . . .		5 »	translucens rubra . . . . .		3 »	12 espèces . . . . .		12 »
coccinea . . . . .		4 »	transparens . . . . .		5 »	24 » . . . . .		20 »
crassifolia . . . . .		5 à 8 »	tubiflora (Willd.) . . . . .		4 »	30 » . . . . .		25 »
elegans . . . . .		5 à 8 »	ventricosa (Th.) . . . . .		1 50	GARDOQUIA betonicoides . . . . .		1 »
heteronema (Labill.) . . . . .		2 à 3 »	verticillata . . . . .		3 »	Hookeri (Benth.) . . . . .		1 »
grandiflora (Sm.) . . . . .		2 »	ventricosa purpurea . . . . .		1 50	multiflora . . . . .		1 »
impressa (Labill.) . . . . .		3 »	stellata . . . . .		2 »	species de Bolivia? . . . . .		8 »
lævigata . . . . .		5 »	vernix coccinea. Petit, klein . . . . .		4 »	GASTROLOBIMUM vimineum . . . . .		1 »
mucronulata (R. P.) . . . . .		3 »	vestita . . . . .		4 »	GAULTHERIA mexicana? . . . . .		10 »
nivalis (Grah.) . . . . .		3 »	viridiflora (Andr.) . . . . .		2 »	GERANIUMS OU PELARGONIUM.		
onosmaeflora (Cun.) Lysinema rusci-			Une collection de 25 espèces à notre			NB. Variétés tirées des meilleures		
folia (Sieb.) . . . . .		2 à 5 »	choix. Eine Sammlung von 25 Sorten			sources pour ce beau genre et offrant		
palludosa . . . . .		1 »	nach unserer Wahl . . . . .		25 »	toutes les fleurs du premier ordre.		
pulchella (Sieb.) . . . . .		3 »	ESCALLONIA floribunda (H. H.) . . . . .		1 50	NB. Spielarten welche aus den besten		
major . . . . .		3 »	rubra (Pers.) . . . . .		1 50	Quellen erzogen worden sind, alles Blumen		
variabilis (Lodd.) . . . . .		4 »	EUCALYPTUS cordata (Labill.) . . . . .		5 »	erster Qualität.		
ERICA amœna (Wendl.) incarnata . . . . .		1 50	falcata . . . . .		3 »	Adela (G.), chair rosé, large macule		
arborea (L.) . . . . .		1 »	glauca (Dec.) . . . . .		5 »	pourpre et feu . . . . .		2 50
barbata . . . . .		2 à 3 »	marginata (Smith.) . . . . .		5 »	Adèle Landsmann (Weiss.), rose, ma-		
australis (L.) . . . . .		1 50	paniculata (Smith.) . . . . .		4 »	culc fouettée de brun, forme et tenue		
baccans (L.) . . . . .		2 »	EUCOMIS nana . . . . .		3 »	parfaites . . . . .		5 »
Banksii purpurea . . . . .		2 »	EUGENIA australis (Wendl.) Jambosa			Adelphie (Ch.) . . . . .		1 50
Bowieana (Lodd.) . . . . .		2 à 4 »	australis (DC.) . . . . .		2 50	Alicia (Ch.) . . . . .		2 »
calycina (L.) . . . . .		2 »	EUTAXIA Baxteri (K. et W.) . . . . .		1 50	Amélie (Ch.), roux brun, bordé, carné,		
cerinthoides (L.) . . . . .		4 »	myrtifolia (R. Br.) . . . . .		1 50	multiflore . . . . .		2 »
colorans (Andr.) . . . . .		4 »	EXCOECARIA tinifolia (Swartz.) . . . . .		1 50	Anais Chauvière (Ch.) . . . . .		4 »
concinna (Ait.) . . . . .		1 50	FABIANA imbricata (R. P.) . . . . .		1 25	Arabella (G.) . . . . .		2 »
concolor (Lood.) . . . . .		2 »	FABRICIA lævigata (Sm.) . . . . .		1 50	Belle Alsacienne (Weiss), blanc et chair,		
corsica . . . . .		1 25	FUCHSIA			forme et tenue parfaite . . . . .		5 »
costata superba . . . . .		1 »	amata . . . . .		1 »	Belle Mulhousoise (Weiss), fl. grande		
cubica (L.) . . . . .		1 50	Armide . . . . .		1 »	et parfaite, rose et chair . . . . .		8 »
minor (B.) . . . . .		1 50	Brookmanni . . . . .		1 50	Bijou (Miellez) . . . . .		2 »
cupressima . . . . .		2 »	Chinois . . . . .		» 50	Black dwarf (G.) . . . . .		1 50
cylindrica (And.) . . . . .		2 »	Clara . . . . .		2 »	Bou Maza (Weiss), rose vif, mac. noire		
superba (Hoffms.) . . . . .		3 »	coccinea vera (Smith's) . . . . .		1 »	bordée argent, très-beau . . . . .		10 »
discolor . . . . .		2 »	Cooperi . . . . .		1 »	Bouquet rose (Weiss), rose brillant,		
empetrifolia . . . . .		3 »	Conqueror . . . . .		1 75	forme et tenue parfaites . . . . .		5 »
equatifloris? . . . . .		2 »	grandiflora maxima . . . . .		1 »	Camille (Wilson), beau rose vif, pét.		
exigua (Salisb.) . . . . .		1 »	cordifolia . . . . .		1 »	supér. entièrement recouverts de cra-		
filamentosa (Andr.) . . . . .		1 50	coronet (J. Smith.) . . . . .		» 75	moisi marron . . . . .		2 »
floribunda . . . . .		2 »	corymbiflora (R. B.) . . . . .		75 c. à 3 f.	Caroline Gros (Weiss) . . . . .		3 »
glandinosa? . . . . .		2 »	défiante . . . . .		2 »	Cheran (Madame) . . . . .		4 »
gracilis (Wendl.) . . . . .		1 »	Dezemii (Baumann), belle fleur très-			Claudia Dubras . . . . .		1 »
grandiflora (Linn.) . . . . .		5 »	grande . . . . .		3 »	Cleopatra (Beck), fleur grande, rose		
Hartnelli (Lodd.) . . . . .		4 »	Doctor Jephson . . . . .		3 »	tendre, pét. supér., pourpre marron		
hybernica var. de Mediterranea . . . . .		1 50	Duchesse of Sutherland . . . . .		2 50	velouté . . . . .		4 »
hyemalis . . . . .		2 »	Emperor (Harrisson) . . . . .		2 »	Comte de Langenstein (Weiss) . . . . .		3 »
ignescens (Andr.) . . . . .		2 »	Esmeralda (Miellez) . . . . .		2 50	Comte Hulin (Weiss) . . . . .		3 »
intervallaris . . . . .		1 à 3 »	Estella . . . . .		2 »	Comtesse Menans . . . . .		4 »
laniflora (Wendl.) . . . . .		1 50	Fanny Esler (Miellez) . . . . .		1 »	Conflagration (J.), écarlate vermillon,		
longipes . . . . .		3 »	Fairy Rosamunda (Harrisson) . . . . .		2 »	macule striée de noir . . . . .		3 »
mammosa (L.) . . . . .		3 »	formosissima . . . . .		2 »	Coquette (G.), fleur très-grande, rose		
coccinea . . . . .		3 50	fulgens (B. R.) . . . . .		50 c. à 3 f.	vif, macule large, noir et cramoisi . . . . .		6 »
major . . . . .		2 »	multiflora . . . . .		1 »	Cressida . . . . .		2 »
minor . . . . .		3 »	superba . . . . .		1 »	Crisseldis (Weiss) . . . . .		3 »
mediterranea (L.) « . . . . .		1 »	Gabrielle d'Estrée . . . . .		1 50	Cyclops (Garth's), fleur grande, rose		
Monsonia (L.) . . . . .		3 »	gigantea . . . . .		1 »	très-vif, large mac. pourp. noir en-		
montana (Bedf. E.) fabrilis (Salisb.) . . . . .		3 »	Hector . . . . .		» 50	tourée de carmin . . . . .		5 »
multiflorum anglorum (Hort.) . . . . .		2 »						



<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.
Denil d'Oconnel (Weiss), lilas violet, macule noire, forme et tenue parfaites . . . . .	8 »	forme très-gracieuse, plante trapue et florifère . . . . .	5 »	HYDRANGEA opuloides (Lam.) . . . . .	1 »
Discount (Garth's) . . . . .	1 »	Pluto (Thurtell), fleur très-grande, pét. supér. maculés noir très-vif. . . . .	4 »	moyenne force . . . . .	2 »
Docteur Pétry (Weiss) . . . . .	3 »	Prince d'Jelma (Weiss), rose cerise, macule lilas bleu et cramoisi, bonne forme . . . . .	5 »	forte plante . . . . .	2 »
Duchesse d'Abrantès . . . . .	2 »	Prince of Wales (Gaine) . . . . .	3 »	cœrulea . . . . .	1 50
Duchesse of Leinster (Ges.), fleur gr., pét. supér. vermillon, macule noire très-nette . . . . .	6 »	QUEEN VICTORIA, superbe blanc . . . . .	5 »	forte plante . . . . .	6 »
Duke of Sutherland (G.), fleurs très-grandes, pét. supér. orange écarlate . . . . .	2 50	Rebecca (Forst.) . . . . .	2 »	japonica . . . . .	1 à 3 »
Dumont d'Urville (Ch.), fleur très-grande, rose cerise, large macule noire et cramoisi . . . . .	6 »	Rienzi (G.) . . . . .	2 »	HYDROLEA spinosa (Lin.), aquatique . . . . .	2 à 4 »
Duquesnoy, fleurs très-grandes, pét. supér. mac. large, noir veiné de pourpre . . . . .	4 »	Rose chérie (Weiss), rose, mac. brune velours bordé d'argent, cœur blanc . . . . .	10 »	HYPERICUM japonicum (Thunb.) . . . . .	2 »
Eclipse (Sweets) . . . . .	3 »	Rose parfait (Weiss), très-beau rose . . . . .	4 »	ILEX excelsa . . . . .	4 à 8 »
Elise (Mieliez) . . . . .	1 50	Schlumberger-Schouck, Mme (Weiss), grande et belle fleur couleur de chair, macule brune, forme parfaite . . . . .	5 »	gigantea . . . . .	10 »
Emma Weiss (Weiss), fl. grande, rose tendre, macule velours violet foncé, bonne forme . . . . .	10 »	Salomé (Chauv.), blanc neige, macule rose . . . . .	3 »	LATIFOLIA (Thunb.) . . . . .	4 à 8 »
Emperor . . . . .	2 »	Severa . . . . .	4 »	ILICIIUM anisatum (L.) . . . . .	2 »
faire maid of Devon (Chauv.) . . . . .	3 »	Sophie Roux (Weiss), blanc, macule violette, florifère, belle forme . . . . .	5 »	floridanum (L.) . . . . .	2 50
Figaro . . . . .	2 »	Tricolor . . . . .	1 à 2 »	religiosum . . . . .	3 à 5 »
fire fly . . . . .	2 »	Triomphe d'Effen . . . . .	3 »	INDIGOFERA australis (Willd.) . . . . .	1 »
Fleur de Marie . . . . .	3 »	TRIOMPHE DU HAUT-RHIN (Weiss) fleur très-grande, macule large d'un brun brillant liséré de rose, coloris nouveau . . . . .	10 »	Dosua (Hamil.) . . . . .	3 à 10 »
Fortuna . . . . .	2 50	Victory (Garth's) . . . . .	2 »	verucosa . . . . .	1 50
Gaine's King . . . . .	1 50	Wild fire (Forst.) . . . . .	2 50	ISOPOGON formosus . . . . .	3 »
GLOIRE DE MULHOUSE (Weiss), chair lavé de rose, très-grande fleur, forme et tenue parfaites . . . . .	8 »	Les Géraniums marqués de Weiss nous ont été cédés par un amateur zélé de ce genre et proviennent de semis qu'il a obtenus depuis quelques années. Ils sont tous d'un grand mérite et peuvent généralement être comptés parmi les fleurs de premier ordre.		ISOTOMA axillaris (R. Br.) . . . . .	1 »
Grand Duke (Gaine's) . . . . .	1 50	Une collection, à notre choix, de 25 belles variétés. Eine Sammlung von 25 Sorten, nach unserer Wahl . . . . .		JASMINUM azoricum (L.) . . . . .	1 50
Haidé (Weiss) . . . . .	3 »	NB. Indépendamment des variétés dénommées, nous en possédons encore beaucoup d'autres plus anciennement publiées, que nous pouvons fournir de 50 à 75 cent. la pièce.		grandiflorum (L.) . . . . .	1 50
Hector (Cock), fl. gr. carnée, nuancée de rose, pét. supér. recouverts d'une macule noire et cramoisi feu . . . . .	3 »	NB. Außer den obenbenannten, besigen wir noch mehrere schon länger bekannte Sorten, die wir 50 bis 75 C. abgeben können.		nepalense (Spr.) . . . . .	2 »
Iewes (Forst.) . . . . .	1 50	GNAPHALUM orientale (L.). Helichr. or. (Gärtn.) . . . . .		heterophyllum (Wall.) . . . . .	2 »
Intrus (Weiss) . . . . .	3 »	GNIDIA denudata (Lindl.), G. imbricata (Lin.) . . . . .		odoratissimum (L.) . . . . .	2 »
John Bull (G.) . . . . .	2 »	simplex (W.) . . . . .		Wallichianum (Lindl.) . . . . .	1 50
Joséphine (Oudin), rose, mac. brune . . . . .	3 »	GORDONIA Lasianthus (L.) . . . . .		LALAGE ornata . . . . .	20 »
Lamartine (Weiss), fleur très-grande, rose tendre, centre blanc, mac. fouettée de brun bordé de carmin . . . . .	10 »	GREVILLEA acanthifolia (Sieb.) . . . . .		LAMBERTIA echinata (R. Br.) . . . . .	2 à 4 »
Lia (Weiss) . . . . .	4 »	Baueri (R. Br.) pubescens (Hook.) . . . . .		formosa (Sm.) . . . . .	1 50 à 3
Lola Montès (Weiss), brillant coloris, bonne forme . . . . .	6 »	bipinnatifida . . . . .		propinqua (R. Br.) . . . . .	1 à 3 »
MADAME DE SONNENBERG (Weiss) . . . . .	8 »	ceratophylla . . . . .		LASIOPETALUM solanaceum (R. M.), Thomasia solanacea (DC.) . . . . .	1 50
MADAME IWAN SCHLUMBERGER nouveau coloris, fleur magnifique . . . . .	10 »	ferruginea (Sieb.) . . . . .		LAURUS camphora (L.) . . . . .	4 »
Madame Marie Scheffter (Weiss), rose vif . . . . .	6 »	juniperina (R. Br.) . . . . .		caroliniensis (Mich.) . . . . .	1 50
Madame Oswald Linder (Weiss), rose chair, macule large et superbe fleur . . . . .	5 »	Lawrenceana . . . . .		fœtens (Ait.) . . . . .	2 »
Madame Weiss (Weiss) . . . . .	5 »	Manglesii (Hort.). Manglesia cuneata (Endl.) . . . . .		glaucophylla? . . . . .	2 »
Mademoiselle Emilie Manz (Weiss) . . . . .	5 »	robusta (Cunn.) . . . . .		indica (Linn.) . . . . .	3 »
Madona (Stewart's) . . . . .	3 »	rosmarinifolia (Cunn.) . . . . .		involuta (Heb.) . . . . .	2 »
Magog (Garth's), fl. très-grande, chair largement maculée noir veiné de cramoisi feu . . . . .	5 »	sericea . . . . .		nobilis (L.) . . . . .	1 à 10 »
Marshal Bugeaud (Weiss), rose vif, cœur blanc, mac. velours brun, forme parfaite . . . . .	10 »	Sternbergiana . . . . .		salicifolia . . . . .	2 »
Ma tante Lise (Weiss), lilas clair, mac. violet foncé, forme et tenue parfaites, plante trapue et florifère . . . . .	10 »	sulphurea (Cunn.) . . . . .		foliis variegatis . . . . .	2 »
Mazeppa . . . . .	2 »	Thelemaniana (Hug.) . . . . .		Persea (L.). Persea gratissima (Goert.) . . . . .	10 »
Mogul, fleur grande, cerise carminé, pét. supér. largement maculés marron noir et feu . . . . .	6 »	vestita . . . . .		tomentosa . . . . .	2 »
MONTE CHRISTO (Weiss.), nouveau de semis, belle fleur et beau coloris . . . . .	8 »	HAKEA Baxteri (R. Br.) . . . . .		LESCHENAULTIA biloba . . . . .	1 50
Mulberg (C.), rose vif, macule brune foncée lisérée de cerise . . . . .	4 »	ceratophylla (R. Br.) . . . . .		drumondi . . . . .	1 »
Napoléon Baumann (Weiss), rose cerise vif et noir, forme et tenue parfaites . . . . .	5 »	flexilis (R. Br.) . . . . .		formosa (R. Br.) . . . . .	75 »
Non such (G.) . . . . .	2 »	Lambertii (Sweet.) . . . . .		oblata . . . . .	1 »
Numa Pompilius (Weiss) . . . . .	6 »	nitida (R. Br.) . . . . .		LEPTOSPERMUM dubium? . . . . .	1 50
Olivier (Tweste) . . . . .	1 »	palmata . . . . .		grandiflorum (Lodd.) . . . . .	1 50
Osai (Weiss), carné, pét. supér., rose clair fondu de velours brun et cerise . . . . .	5 »	pugioniformis (Cav.) . . . . .		thymifolium (Cels.) . . . . .	1 50
Paul I <sup>er</sup> (Weiss) . . . . .	4 »	saligna (R. Br.) . . . . .		LEUCOTHOE buxifolia (DC.). Andromeda buxifolia . . . . .	1 à 3 »
Petite Beri (Weiss), fleur rose ondulée, . . . . .		species de Swan River . . . . .		LINARIA triornitophora . . . . .	1 »
		HOVEA Celsii (Boupl.) . . . . .		LIPARIA sphaerica . . . . .	2 »
		pungens . . . . .		LINUM suffruticosum . . . . .	1 50
		purpurea . . . . .		LITHOSPERMUM rosmarinifolium (Ten.) . . . . .	1 »
		HOUSTONIA coccinea (Andr.) . . . . .		LOBELIA Erinus (L.) . . . . .	1 »
		HYDRANGEA Hortensis (DC.). Hortensia		Richardsonii . . . . .	2 »
				Surinamensis . . . . .	1 50
				LOMATIA ilicifolia (R. B.) . . . . .	4 »
				longifolia (R. Br.) . . . . .	3 »
				silaifolia (R. Br.) . . . . .	4 à 10 »
				MAGNOLIA fuscata (Andr.) . . . . .	2 à 4 »
				grandiflora (L.) . . . . .	2 50
				Biquelin . . . . .	3 »
				canaliculata . . . . .	3 »
				Exmouth . . . . .	4 »
				glabra ovata . . . . .	4 »
				HARTWICUS, nouvelle hybride du pumila et grandiflora, nain et multiflore . . . . .	6 »
				latifolia . . . . .	4 »
				oxoniensis . . . . .	3 »
				præcox . . . . .	4 »
				pumila (Andr.) . . . . .	2 à 4 »
				rotundifolia . . . . .	3 »
				undulata . . . . .	3 »
				MALVA lateritia . . . . .	3 »
				MAHERNIA incisa . . . . .	1 »
				MANGLESIA Drumondi . . . . .	2 »
				MELALEUCA calycina (R. Br.) . . . . .	1 50
				decussata (R. B.) . . . . .	1 50
				fulgens (R. Br.) . . . . .	1 50
				ovata (Hort.) . . . . .	1 »
				pulchella (R. Br.) . . . . .	1 50



<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.
MELALEUCA species N° 2 Swan river .	5 »	PETUNIA Donald . . . . .	1 »	PROTEA pallens (Linn.) . . . . .	2 »
N° 3 » . . . . .	5 »	Frédéric II. . . . .	1 50	pinifolia (L.). Aulax pinifolia (Berg.)	4 »
MENISPERMUM laurifolium (Roxb.) .	2 »	Général Tom Pouce, <i>petite mignature</i>	1 »	plumosa (Ait.) . . . . .	5 »
Cocculus laurifolius (DC.) . . . . .	1 »	ma favorite, <i>blanc strié de pourpre</i> .	1 »	saligna (L.) . . . . .	3 50
MESEMBRYANTHEMUM barbatum (L.) .	1 »	maxima . . . . .	1 »	umbellata . . . . .	4 »
diminutum (Haw.) . . . . .	1 50	Melpomène, <i>pourpre brillant</i> , g. fl.	1 »	PSOROPHYTUM undulatum (Spach.) .	3 »
spectabile (Haw.) . . . . .	2 »	mon Henry, <i>rose strié de blanc en</i>	2 »	PULTENÆA flexilis (DC.) . . . . .	1 50
tigrinum . . . . .	1 »	<i>œillet</i> . . . . .	1 »	retusa (Sm.) . . . . .	1 50
MESILUS japonica (Willd.) . . . . .	1 à 2 »	mignonne, <i>blanc centre strié</i> . . .	1 »	subumbellata (Hook.) . . . . .	1 »
METROSIDEROS albida . . . . .	2 50	Pagina Maria . . . . .	1 50	tenuifolia (R. Br.) . . . . .	1 »
lanceolata . . . . .	2 »	Princesse Léopoldine . . . . .	1 50	PUNICA granatum (L.) . . . . .	1 »
nodosa ? . . . . .	1 »	Sophie . . . . .	1 »	sujets en tige . . . . .	6 à 10 »
præcox . . . . .	1 à 3 »	Queen of the May . . . . .	1 »	lutea . . . . .	1 à 3 »
ruscifolia . . . . .	1 50	Superbe . . . . .	1 »	fl. pleno . . . . .	2 »
semperflorens (Lodd.) . . . . .	2 »	PHLOX Drummondii (Hook.) . . .	1 »	sujets en tige . . . . .	5 à 25 »
viridiflora (Hort. Cels.) <i>Calistemon</i>	1 50	Donkelari . . . . .	1 »	prolifera . . . . .	3 »
<i>viridiflorus</i> (DC.) . . . . .	1 50	PHORMIUM tenax (Forst.) . . . . .	1 50	nana (L.) . . . . .	3 »
MIMULUS guttatus fulgens . . . . .	1 »	PHOTINIA lævis. <i>Ph. lævigata</i> . . .	1 50	QUERCUS rugosa (Nee) . . . . .	3 »
eximius . . . . .	1 50	serrulata (Lindl.) . . . . .	1 50	RAPHIOLEPIS indica (Lindl.) . . .	1 50
MIRBELIA ilicifolia. <i>M. undulata</i> .	2 à 6 »	PHYLLICA paniculata (Willd.) . . .	2 »	salicifolia . . . . .	1 »
MONSONIA filia ? . . . . .	1 »	rosmarinifolia (Lam.) Soulangia axil-	1 »	RHEXIA elegans ? . . . . .	2 »
lobata (Ait.) . . . . .	1 »	laris (Brog.) . . . . .	5 à 100		
speciosa . . . . .	1 »	PHYLLICLADUS TRICHOMANOIDES .	2 »		
MORÆA iridoides (L.). <i>Iris morœoides</i>	2 »	calycina (DC.) . . . . .	» 50		
(Ker.) . . . . .	1 »	PIMELEA drupacea (Labill.) . . . . .	1 »		
MYOPORUM rubricaula (Hort.) . . .	5 à 10 »	decussata rubra . . . . .	1 »		
MYRTUS bullata (Salisb.) . . . . .	1 à 8 »	hypericina (Hook.) . . . . .	3 »		
communis (L.) . . . . .	1 50 à 6	mirabilis . . . . .	2 »		
foliis variegatis . . . . .	1 à 8 »	nivea (Babill.) . . . . .	150 à 4 f.		
romana . . . . .	2 à 3 »	spectabilis . . . . .	2 »		
horizontalis (Vent.) <i>Eugenia disti-</i>	1 50	sylvestris (R. Br.) . . . . .	5 »		
<i>cha</i> . . . . .	1 50	PINCKNEYA PUBENS (Pers.) . . . .	2 à 20 »		
mucronata (Pers.) . . . . .	1 50	Coulteri (Don.) . . . . .	10 »		
toentina (Mill.) . . . . .	1 50	Deodora (Roxb.) Cedrus Deodora .	3 à 6 »		
NANDINA domestica (Thunb.) . . .	1 à 3 »	Douglasi (Lamb.) . . . . .	20 »		
NERIUM oleander (L.) . . . . .	1 »	filifolia . . . . .	5 à 25 »		
flore albo pleno . . . . .	2 »	longifolia (Lamb.) . . . . .	4 à 20 »		
atropurpureum odoratissimum . . .	2 »	<i>Un échantillon haut de 1 mètre 50</i>	30 »		
cardinalis flore pleno . . . . .	1 50	<i>centimètre</i> . . . . .	1 à 8 »		
carnea variegata . . . . .	1 »	palustris (Mill.) <i>Australis</i> (Mich.)	5 à 40 »		
coccineum . . . . .	1 50	patula . . . . .	2 »		
elegans . . . . .	2 »	pinea (Linn.) . . . . .	10 à 35		
Foncolombinum, <i>double blanc</i> . . .	1 50	religiosa . . . . .	20 »		
grandiflorum pleno . . . . .	1 50	species du Mexique à très-longues	1 50		
Grisard du Sauguet . . . . .	1 50	aiguilles . . . . .	2 à 3 »		
Henry de France . . . . .	1 50	PISTACIA Terebinthus (Linn.) . . .	1 »		
Jeanne d'Arc . . . . .	1 50	PITTOSPORUM revolutum . . . . .	1 »		
lacteolum . . . . .	1 50	sinense (Desf.) . . . . .	1 »		
lateum. <i>N: pumilum</i> . . . . .	1 50	Tobira (Ait.) . . . . .	2 »		
Mabiri . . . . .	1 50	foliis variegatis . . . . .	1 »		
maculatum (W.) . . . . .	2 »	undulatum (Vent.) . . . . .	1 50		
pumilum <i>luteum</i> . . . . .	2 »	foliis variegatis . . . . .	2 à 8 »		
punctatum plenum . . . . .	2 »	Jacca (C. Don.) . . . . .	3 à 5 »		
purpureum . . . . .	2 »	latifolius . . . . .	4 à 5 »		
coccineum . . . . .	2 »	longifolius . . . . .	3 à 20 »		
Quellenii flore pleno . . . . .	2 »	macrophyllus (Wall.) . . . . .	3 à 15 »		
Richardsoni . . . . .	1 50	nuciferus (Lodd.) . . . . .	3 »		
salicifolium . . . . .	2 »	POINCIANA Gillesi . . . . .	2 à 3 »		
spectabile . . . . .	1 50	POLYGALA borboniæfolia (Burch.) .	1 »		
foliis variegatis . . . . .	3 »	cordifolia (Thunb.) . . . . .	1 à 3 »		
superbum . . . . .	1 50	Dalmaisia . . . . .	1 50		
tinctorium . . . . .	1 50	grandiflora (B. C.) . . . . .	1 »		
variegat. simplex . . . . .	2 50	Heisteria (L.) Muraltia Heist (DC.)	1 »		
splendens flore pleno . . . . .	» 75	latifolia (Br.) . . . . .	1 50		
foliis variegatis . . . . .	3 »	speciosa (Sims.) . . . . .	1 »		
NIERENBERGIA filicaulis (Lindl.) .	10 »	Zeyheri (Spreng.) . . . . .	2 »		
NYMPHÆA cœrulea (W.) . . . . .	1 à 3 »	PONTEDERIA cordata (L.) . . . . .	2 »		
Lotus . . . . .	1 à 2 »	PORLERIA hygrometrica (Ruiz et Paw.)	1 50		
OLEA europæa (W.) . . . . .	1 à 3 »	PRIMULA chinensis (Lour.) . . . . .	1 »		
buxifolia . . . . .	1 à 2 »	flore albo . . . . .	1 50		
fragrans (Thunb.) . . . . .	1 à 3 »	pleno . . . . .	2 à 6 »		
OXALIS Bovii (Lodd.) . . . . .	1 »	rubro pleno . . . . .	6 à 10 »		
reptatrix (Jacq.) . . . . .	1 »	Palinuri (R. S.) . . . . .	2 »		
rosea (Jacq.), floribunda (B. R.) .	1 »	PROSTANTHERA lasianthos (Lab) . .	1 à 2 »		
pectinata (Jacq.) . . . . .	1 »	rotundifolia (R. Br.) . . . . .	1 50		
OXYLOBIUM arborescens (R. Br.) . .	3 »	violacea (R. Br.) . . . . .	1 50		
PENSTEMON primuloides, P. mexicanum	» 50	PROTEA coccinea . . . . .	6 »		
PETROPHILA pedunculata (R. Br.) .	3 »	cordata . . . . .	10 »		
pulchella (R. Br.) . . . . .	3 »	cynaroides . . . . .	4 à 8 »		
PETUNIA Apollo . . . . .	1 »	insignis . . . . .	6 »		
Beauté du jour, <i>pourpre brillant</i> .	1 50	nerifolia . . . . .	5 »		
Beauty Sophia . . . . .	1 »				
conservation . . . . .	» 50				
delicatissima . . . . .	1 »				



<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>	<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>	<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>
RHODODENDRON arboreum venustum . . . . .	10 à 20	STEVIA Lindleyana . . . . .	1 »	VERBENA Monfortii . . . . .	1 »
Wiltoni . . . . .	3 »	STYPHELIA tubiflora (Smith.) . . . . .	3 »	Musiana . . . . .	» 50
Altaclarens (Lindl.) . . . . .	3 à 10 »	viridiflora . . . . .	» »	nec plus ultra . . . . .	» 50
campanulatum (Wall.) . . . . .	3 à 10 »	STYLIDIUM adnatum (R. B.) . . . . .	1 »	Paul . . . . .	» 50
cartonianum (DC.) . . . . .	4 »	androsaceum . . . . .	4 »	Phoenix . . . . .	1 »
cinnamomeum (Lindl.) . . . . .	4 à 20 »	coccineum . . . . .	1 50	Regeli . . . . .	1 »
Tarrerri . . . . .	4 »	Drumondi . . . . .	10 »	rosa odorata . . . . .	1 »
Gowenianum (B. F. G.) . . . . .	3 à 8 »	fruticosum . . . . .	1 »	splendens . . . . .	1 »
Gypsoni . . . . .	10 à 20	SWAINSONIA coronillæfolia fl. rubra . . . . .	1 75	superba . . . . .	» 50
Une collection de Rhododendron arbo-		TASMANIA aromatica . . . . .	12 »	Teucrioides atrosanguinea . . . . .	1 »
reum de 15 variétés à notre choix.		TAXUS capensis (Lin.) . . . . .	2 »	foliis variegatis . . . . .	1 »
Eine Sammlung von 15 Sorten Rho-		nucifera (Linn.) . Podocarpus nucif. . . . .	2 à 3 »	violet superbe . . . . .	1 »
dodendron arboreum, nach unserer		TEMPLETONIA retusa (R. Br.) . . . . .	2 »	vitabilis . . . . .	» 50
Wahl . . . . .	25 »	glauca (Sims.) . . . . .	1 50	Voltaire . . . . .	» 75
Une collection de 25 espèces et varié-		species nova? . . . . .	10 »	Wonder of scarlet (Irrey) . . . . .	» 75
tés, à notre choix. Eine Sammlung		TETRANEMA mexicana. Penstemon pri-		Une collection de 20 Verbena bien as-	
von 25 Sorten, nach unserer Wahl . . . . .	37 50	muloides . . . . .	1 »	sortis. Eine Sammlung von 20 gut as-	
Des individus forts, d'un à deux mètres.		THEA camellioides . . . . .	3 »	fortierten Sorten . . . . .	9 »
Stück Exemplar von 3 bis 6 Fuß. . . . .	10 à 25	Bohea (Linn.) . . . . .	2 »	Plus une collection de 15 variétés à	
RIBES albidum . . . . .	2 »	sassangua . . . . .	2 »	notre choix . . . . .	6 »
du Chili, nouveau . . . . .	3 »	viridis (Linn.) . . . . .	2 »	Une collection de 30 variétés à notre	
RUPELLIA azurea . . . . .	1 50	THERMOPSIS laburnifolia (Don.) . . . . .	3 »	choix . . . . .	15 »
SALVIA azurea (Lam.) . . . . .	1 50	THOMASIA macrocarpa . . . . .	2 »	VERONICA salicifolia . . . . .	2 »
cardinalis (Humb.) . . . . .	» 50	TREMANDRA floribunda . . . . .	1 50	speciosa . . . . .	1 à 1 50
coccinea (L.) . . . . .	» 50	TRISTANIA laurina (R. Br.) . . . . .	3 »	species de la Nouvelle-Zélande . . . . .	2 »
confertiflora . . . . .	2 »	neriifolia (R. Br.) . . . . .	2 50	VIBURNUM dentatum (L.) . . . . .	1 50
ericalis . . . . .	1 »	ULEX hybernicus (DS.) . . . . .	1 50	japonicum . . . . .	5 »
fulgens (Cav.) . . . . .	1 50	nepalensis . . . . .	1 »	oderatissimum (Ker.) . . . . .	2 »
Grahami (DS.) . . . . .	» 50	VERBENA		Tinus (W.) . . . . .	75 c. à 5 f.
patens (Cav.) . . . . .	1 50	alba grandiflora . . . . .	1 »	foliis variegatis . . . . .	1 à 8 »
splendens (Ker.) . . . . .	1 50	Anais . . . . .	» 50	WESTRINHIA angustifolia (R. Br.) . . . . .	2 »
tricolor var. s. officinalis . . . . .	1 »	Beauté suprême, rose superbe . . . . .	1 »	triphylla (Ait.) . . . . .	2 »
SCUTELLARIA splendens (Link.) . . . . .	1 à 2 »	bicolor odorata . . . . .	» 50	WHITFIELDIA lateritia . . . . .	3 »
SELAGO Gillii (Bot. Reg.) . . . . .	2 »	Buisti bicolor . . . . .	» 50	WITSENIA corymbosa (Sm.) . . . . .	4 »
SEMPERVIVUM arboreum . . . . .	1 50	roseo superba . . . . .	1 »	XENOPOMA obovata (W.) . . . . .	1 50
variegatum . . . . .	1 50	Carli . . . . .	» 50	YUCCA aloifolia (L.) . . . . .	4 »
tabulæformis . . . . .	3 »	Comte de Paris, magnifique . . . . .	1 »	foliis variegatis . . . . .	4 à 40 »
SIPHOCAMPYLUS betulæfolius . . . . .	1 »	Corbelli . . . . .	1 50	flaccida (Haw.) . . . . .	4 »
bicolor (Sims.) . . . . .	1 »	Curraï (Baumann's), couleur plus vive		glaucescens (Haw.) . . . . .	3 »
coccineus . . . . .	2 »	que fine scarlet . . . . .	2 »	gloriosa (L.) . . . . .	3 »
cordatus . . . . .	1 50	Drumondi . . . . .	1 »	recurva (Salisb.) . . . . .	4 »
duplo serratus . . . . .	1 50	Duchesse d'Orléans, rose, centre blanc		ZIERIA trifoliata (Sm.) . . . . .	2 »
lantanifolius . . . . .	1 »	superbe . . . . .	1 »	Nous offrons en outre:	
longipedunculatus . . . . .	1 »	Empereur du Maroc . . . . .	1 »	1 <sup>o</sup> Une collection de 50 plantes, en 50	
SPARMANNIA suberosa (Hort.) . . . . .	2 »	fine scarlet . . . . .	» 75	espèces, à notre choix . . . . .	25 »
SPHÆNOTOMA squarrosum . . . . .	5 à 10 »	Gœthe (Baumann's) . . . . .	2 »	2 <sup>o</sup> Une collection de 75 plantes, en 75	
SPIGELIA nova ceylanica . . . . .	3 »	igneæ, écarlate vif . . . . .	1 50	espèces . . . . .	45 »
STATICE arborea (Brouss.) . . . . .	5 à 25 »	Impératrice Joséphine, bleu superbe	1 50	3 <sup>o</sup> Une collection de 100 plantes, en	
Dicksonia . . . . .	3 à 5 »	lilacina grandiflora . . . . .	» 50	100 espèces . . . . .	70 »
grandiflora (Hérit.) . . . . .	1 50	magniflora . . . . .	1 »		
monopetala (Linn.) . . . . .	1 50				

## PLANTES GRIMPANTES DE SERRE CHAUDE, TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE.

<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>	<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>	<i>La pièce. Das Stück.</i>	<i>fr. c.</i>
Les espèces marquées d'un * sont		BAUERSIA maculata? . . . . .	2 »	CLERODENDRON splendens (Hugel) . . . . .	2 à 4 »
pour serre chaude.		* BEAUMONTIA grandiflora . . . . .	3 »	COBÆE scandens (Cav.) . . . . .	» 50
Die mit * bezeichneten Sorten sind für's		* BAUHINIA macrophylla . . . . .	10 »	stipularis (Hort.) . . . . .	» 75
warme Haus.		BIGNONIA capensis . . . . .	1 »	* COLUMNEA scandens . . . . .	2 »
* ÆSCHYNANTHUS Boschianus . . . . .	2 »	capreolata (L.) . . . . .	1 »	* COMBRETUM Afzeli (Don.) . . . . .	4 à 8 »
* grandiflora (Spr.) . Iucarvillea pa-		heterophylla (W.) . Kereri (Aubl.) . . . . .	2 »	* macrophyllum (Roxb.) . . . . .	5 »
rasitica (Roxb.) . . . . .	1 50	jasminifolia (H. B.) . . . . .	2 »	* purpureum . . . . .	4 à 8 »
* Roxburghii. A. macrophyllus . . . . .	2 »	Pandorana . . . . .	2 50	ECCREMOCARPUS scaber (R. P.) . . . . .	1 »
ALSTROEMERIA acutifolia . . . . .	2 »	speciosa . . . . .	1 à 2 »	* ECHITES purpurea . . . . .	7 à 10 »
AMPHICOME arguta (Royale) . . . . .	1 »	Twedeana . . . . .	1 à 2 »	* picta . . . . .	2 à 5 »
ARGYREA nervosa . . . . .	10 »	* venusta. Tecoma venusta . . . . .	2 »	* FIGUS repens (Roxb.) . . . . .	» 75
* ARISTOLOCHIA barbata (Jacq.) . . . . .	2 »	* BOUGAINVILLEA spectabilis (Willd.) . . . . .	1 à 3 »	* GARDENIA Scherbourneæ . . . . .	3 »
Gigas . . . . .	3 »	BRACHYSEMA undulatum (Ker.) . . . . .	5 »	* GLORIOSA superba (W.) . . . . .	2 à 3 »
* labiosa (Ker.) . . . . .	2 »	* BRUGMANSIA floribunda. Juvauloa		GLYCINE brachyphylla? Brachybotrya?	
* saccata . . . . .	1 à 3 »	aurantiaca . . . . .	3 »	chinensis coccinea . . . . .	3 »
sempervirens . . . . .	1 50	CADSURA japonica (Van Sieb.) . . . . .	1 50	HARDENBERGIA monophylla (Bth.) Gly-	
tomentosa . . . . .	1 à 2 »	CAJOPHORA lateriata (Loasa) . . . . .	» 50	cine bimaculata (Hort.) . . . . .	1 »
ARUM auriculatum . . . . .	3 »	CANDOLLEA Cuninghamsi (Hort.) . . . . .	2 »	Comptoniana (Bth.) . . . . .	1 »
* ASCLEPIAS carnosæ (L.) . Hoya carnosæ		* CEROPEGIA elegans (Hook.) . . . . .	1 »	macrophylla (Benth.) . . . . .	2 »
(R. B.) . . . . .	1 à 2 »	* africana (R. B.) . . . . .	1 50	ovata (Benth.) . . . . .	2 »
* coccinea . . . . .	2 à 3 »	CHORIZEMA cordatum (Lindl.) . . . . .	1 »	HIBBERTIA crenata (Andr.) . H. gros-	
* pendula . . . . .	3 »	illicifolium (Lah.) . . . . .	1 »	sulariaefolia (Satisb.) . . . . .	2 »
* BANISTERIA tenuis . . . . .	1 50	rhombenm (R. Br.) . . . . .	» 75	* IPOMEA Horsfalliæ (Hook.) . . . . .	2 à 4 »
* argentea . . . . .	5 »	spectabilis . . . . .	1 50	* Leari . . . . .	1 »
BASILLA tuberosa . . . . .	1 50	CLEMATIS florida (Th.) . flore pleno . . . . .	2 »	mexicana . . . . .	1 »
BATATAS betacea. Ipomea Humboldt . . . . .	1 »	insulensis . . . . .	4 à 6 »	rubra cœrulea . . . . .	1 »
Wildenowii . . . . .	1 »	japonica (Thunb.) . . . . .	3 »	Selloi . . . . .	1 »



<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.	<i>La pièce. Das Stück.</i>	fr. c.
IPOMEA species de la Chine. . . . .	5 »	MAURANDIA spec. de la Chine N° 2 .	6 »	Rosa lutea pallida . . . . .	1 »
Schuttleworthii, à feuilles palmées et fleurs en bouquets . . . . .	10 »	MEDEOLA asparagoides (L.). <i>Myrsiphyll-</i> <i>um asparagoides</i> (Willd.) . . . . .	1 50	plena . . . . .	1 »
* JASMINUM Azoricum. . . . .	1 »	MICANIA senceioides. . . . .	1 »	Roi des Banks. . . . .	1 »
grandiflorum. . . . .	1 à 3 »	MIMOSA prostrata. . . . .	2 »	multiflora plena . . . . .	1 »
heterophyllum (Wall.) . . . . .	1 50	* MORINDA odorata? . . . . .	2 »	purpurea plena . . . . .	1 »
nepalense (Spr.) . . . . .	1 50	MUTISIA speciosa (Hook.) . . . . .	2 »	* RUBUS japonicus . . . . .	2 »
* Sambac fl. plena. . . . .	1 à 3 »	PASSIFLORA edulis (Sims.) . . . . .	1 50	molucanus (Linn.) . . . . .	2 »
Wallichianum (Lindl.) . . . . .	1 50	coerulea (L.) . . . . .	1 50	SERIANA velutina. . . . .	3 »
KENNEDYA Marryatiana (Lindl.) . . . . .	3 »	* Herbertiana (Ker.) . . . . .	1 50	SOLLYA heterophylla (Lindl.) . . . . .	3 »
glabrata . . . . .	1 50	* holosericea . . . . .	1 50	salicifolia, . . . . .	1 50
OBLONGATA (Lem.). <i>Kennedy</i> <i>Baumannii</i> . . . . .	2 »	* Kermesina (L. et O.) . . . . .	1 50	* STIGMATOPHYLLUM aristatum (Liavt.)	2 »
prostrata (R. B.). <i>Glycine coccin.</i> (C.)	1 50	* Lemicheziana . . . . .	2 »	TACSONIA molissima. . . . .	3 »
rubicunda (Vent.) . . . . .	1 »	* linearis. . . . .	1 à 2 »	TAMUS Elephantipes . . . . .	4 à 60 »
species de la nouvelle Hollande . . . . .	10 »	longipedunculata? . . . . .	2 »	THUNBERGIA alata . . . . .	1 »
splendens nob. . . . .	2 »	* Loudonia (Baum.) . . . . .	1 50	aurantiaca . . . . .	1 »
spectabilis . . . . .	2 »	Mauritiana . . . . .	2 »	chrysops. . . . .	2 à 3 »
undulata . . . . .	2 »	* Neillii . . . . .	2 »	coccinea (Wallich.) . . . . .	1 50
LOMALIA laurifolia . . . . .	2 »	* palmata (Lodd.) . . . . .	» »	Freyeri . . . . .	1 »
LONICERA japonica . . . . .	1 »	* Princeps (Lodd.) . . . . .	1 50	grandiflora (Roxb.) . . . . .	1 50
LOPHOSPERMUM scandens (B. M.), <i>L.</i> <i>erubescens</i> (Don.) . . . . .	1 »	* racemosa . . . . .	1 50	Hawteyana (Wall.) . . . . .	2 »
Hendersoni . . . . .	3 »	* quadrangularis (Linn.) . . . . .	2 »	species nova . . . . .	3 »
atrosanguineum (Zucc.). <i>Rodochiton</i> <i>volubile</i> (Zucc.) . . . . .	1 »	suberosa . . . . .	1 »	TROPÆOLUM lobianum . . . . .	1 50
MANDEVILLEA suavelens . . . . .	1 à 2 »	PHASEOLUS Caracalla (Linn.) . . . . .	2 »	minus (L.), flore pleno . . . . .	1 50
* MANETTIA bicolor. . . . .	2 »	PHILIBERTIA grandiflora . . . . .	1 »	pentaphyllum (Lam.). <i>Chymocarp.</i> <i>pentaphyll.</i> (Don.) . . . . .	» 75
cordifolia (Mart.) . . . . .	1 »	PHYSIANTHUS undulatus (Hort.) . . . . .	2 »	tricolorum (Sweet.) . . . . .	1 à 4 »
splendens . . . . .	3 »	* PIPER magnoliaefolium . . . . .	2 50	TWEEDIA coerulea (Sweet.) . . . . .	1 »
MAURANDIA Barckleyana (Bot. Mag.) .	» 50	* nigrum . . . . .	1 50	ZYCHIA BAUMANNI (Lem.) . . . . .	2 »
Laccayana . . . . .	1 »	* POTHOS undulata . . . . .	5 »	floribunda . . . . .	6 à 12 »
purpurea grandiflora . . . . .	1 50	* PTERIS flexuosa . . . . .	2 à 3 »	rotundifolia. . . . .	10 »
species de la Chine N° 1. . . . .	5 »	RHODOCHITON volubile . . . . .	1 »	Une collection de 15 espèces, à notre choix . . . . .	15 »
		ROSA Banksiana alba plena . . . . .	2 »	Une collection de 20 espèces, à notre choix . . . . .	25 »
		grandiflora alba plena . . . . .	2 »		
		lutea plena . . . . .	1 50		

## OIGNONS ET FLEURS DISPONIBLES. — Blumen- Zwiebeln.

Les expéditions commenceront à la mi-Août. — Die Versendungen beginnen Mitte August's.

Les prix précédés d'un p sont pour la pièce; ceux précédés de % au cent; on ne délivrera pas moins de 25 pièces de ces derniers, sans une augmentation de 6 % du prix marqué.

NB. On fera suivre en remboursement le montant de toute commission qui ne dépassera pas 50 fr., afin d'éviter les frais d'encaissement.

Les espèces marquées d'un \* peuvent être expédiées depuis la fin d'Août jusqu'au commencement de Mai, les temps froids exceptés; celles non marquées, du mois d'Août à la fin de Novembre.

Die Preise welchen ein p vorangeht, sind für das Stück, und diejenigen welchen % vorangeht, für das Hundert. Weniger als 25 werden nur mit einer Erhöhung von 6 % auf den angegebenen Preise abgegeben werden.

Um Incassospesen zu vermeiden, wird der Betrag von jeder Bestellung die sich nicht über 50 Fr. beläuft nachgenommen.

Die mit \* bezeichneten Sorten können vom Ende August bis Anfangs Mai, kalte Witterung ausgenommen, versendet werden, die ohne dieses Zeichen von Anfangs August bis Ende November.

	fr. c.		fr. c.		fr. c.
* ALETIS capensis, <i>Weltheimia capen-</i> <i>sis</i> . . . . .	1 50	* AMARYLLIS undulata valota . . . . .	4 »	* CRINUM strictum . . . . .	4 »
* ALSTROEMERIA aurantiaca . . . . .	1 50	* purpurea . . . . .	3 »	CROCUS sativus . . . . .	3 »
* aurea . . . . .	1 »	* Verauxii . . . . .	5 »	vernus (W.). <i>Une collection de 100</i> <i>pièces en 6 variétés, avec noms.</i> %	5 »
* chilensis en plusieurs nuances. <i>Mise</i> <i>en pleine terre pendant l'été,</i> <i>dans une bonne exposition, cette</i> <i>charmante nouveauté fait un ef-</i> <i>fet merveilleux.</i> . . . .	1 50	* vittata . . . . .	2 50	Une collection mélangée . . . . .	2 50
* hirtella . . . . .	5 »	ANEMONE coronaria (DC.). <i>Une collec-</i> <i>tion de 25 variétés assorties, avec</i> <i>noms</i> . . . . .	7 »	* CYCLAMEN Africanum, nouveau . . . . .	6 à 12 »
* pelegria . . . . .	1 »	Doubles mélangées, dans les meil-		* coum . . . . .	1 à 2 »
* psitacina . . . . .	1 »	leures variétés. . . . . %	10 »	* Europæum . . . . .	50 à 75 c.
* tricolor . . . . .	2 »	Simples mélangées, dans les meil-		* album . . . . .	150 à 2 f.
* AMARYLLIS advena . . . . .	3 »	leures variétés. . . . . %	9 »	* persicum . . . . .	50 c. à fr.
* æquestris . . . . .	3 »	hortensis (R. M.). <i>Doubles mélan-</i> <i>gés, dans les plus belles variétés</i> <i>%</i> . . . . .	20 »	* Neapolitanum . . . . .	1 à 2 »
* fulva . . . . .	3 »	Simples mélangés, dans les meilleures		* CYRTANTHUS spiralis (Burch.) . . . . .	3 »
* atamasco minor. . . . .	1 25	variétés . . . . . %	12 »	* FRITILLARIA imperialis (W.) . . . . .	» 50
* Belladonna . . . . .	1 50	Simples mélangés, second choix. .	9 »	Meleagris (W.). <i>Mélange, Nummcl.</i> %	15 »
* blanda . . . . .	2 »	Semperflorens, ou A. de la Chine .	15 »	Persica . . . . .	» 75
* coccinea . . . . .	5 »	ARUM dracunculul . . . . .	1 »	* GETHYLLIS spec. nova . . . . .	10 »
* crispa . . . . .	1 50	* BOOPHONA ciliaris (Herb.) . . . . .	6 »	GLADIOLUS Alexandrinus . . . . .	1 50
* Fauthergillii . . . . .	3 »	BULBOCODIUM vernum . . . . .	6 »	Bizantinus . . . . .	» 75
* formosissima . . . . .	» 50	* CALOSTEMA Cunninghami (Ast.) . . . . .	10 »	Cardinalis . . . . .	1 »
* Gravini . . . . .	5 »	* COBURGIA flava . . . . .	3 »	éclatante frappante . . . . .	5 »
* Johnsoni . . . . .	3 »	COLCHICUM autumnale (W.) . . . . .	» 30	Emicans . . . . .	» 50
* longifolia . . . . .	5 »	flore pleno . . . . .	» 50	floribundus . . . . .	1 »
* lutea . . . . .	2 »	* CRINUM amabile (Spr.) . . . . .	4 »	formosissima . . . . .	5 »
* regine . . . . .	4 »	* americanum . . . . .	3 à 10 »	Gandavensis . . . . .	3 »
* psitacina . . . . .	3 »	* aquaticum nouveau . . . . .	6 »	Geppini . . . . .	1 »
* species nov. N° 1 du Brésil . . . . .	8 »	* bracteatum (Willd.) . . . . .	10 »	imperialis . . . . .	3 »
» N° 2 » . . . . .	8 »	* Caribæum (B. M.) . . . . .	8 »	Lord John Russel . . . . .	5 »
» N° 4 » . . . . .	10 »	* caladinum? . . . . .	5 »	Lord Palmerston . . . . .	6 »
» N° 30 » . . . . .	8 »	* erubescens? . . . . .	3 »	Merianus . . . . .	2 »
		* latifolium . . . . .	3 »	Prince Albert . . . . .	5 »
				psitacinus . . . . .	1 »
				pulcherrimus . . . . .	1 »



	fr.	c.		fr.	c.		fr.	c.
GLADIOLUS ramosus. . . . . p.	3	»	IXIA lilacina. . . . . p.	»	50	NARCISSES Jonquilla fl. simplex . . .	12	»
Neipergeri, rouge éblouissant . p.	10	»	lineata. . . . . p.	1	»	flore pleno . . . . .	»	40
splendens . . . . . p.	8	»	longiflora . . . . . p.	»	50	RANUNCULUS. Ranunculus 25 Renon-		
tigrinus . . . . . p.	»	»	miniata . . . . . p.	»	50	cules en 25 variétés diverses, dou-		
* HIPPEASTRUM stylosum (Herb.). . p.	5 à 10	»	patens. . . . . p.	»	50	bles, assorties avec noms . . . %	6	»
* HOEMANTHUS coccineus. . . . . p.	2 à 6	»	pavonia . . . . . p.	»	50	Mélange double, premier choix . %	8	»
* Pubescens . . . . . p.	3	»	squalens . . . . . p.	»	50	» second choix . %	5	»
* tigrinus. . . . . p.	3	»	En mélange. Im Rummel. . . . %	15	»	Pivoine rouge. Türkische Ranuncul. %	8	»
HYACINTHUS orientalis (W.). Une col-			* LACHNALIA pedula. . . . . p.	1	50	Turban d'or . . . . . p.	»	20
lection de 25 pièces, en 25 des			* tricolor. . . . . p.	1	50	SCILLA amina . . . . . p.	1	25
plus belles variétés doubles et nou-	25	»	* LAPEYROUSIA grandiflora . . . p.	»	50	autumnalis (L.) . . . . . p.	»	50
velles, avec noms . . . . .			* LILIUM aurantiacum. . . . . p.	1	50	bifolia (L.) . . . . . %	3	»
Une collection de 25 pièces, en 25			* bulbiferum (L.). . . . . p.	1	50	campanulata . . . . . p.	»	50
variétés assorties avec noms, pre-			foliis striatis . . . . . p.	5	»	alba. . . . . p.	»	75
mier choix . . . . .	20	»	* camtschaticum . . . . . p.	1	50	præcops . . . . . p.	1	»
Une collection de 25 variétés, 2 <sup>e</sup>			* canadense (L.) . . . . . p.	1	»	peruviana . . . . . p.	2	»
choix, assorties avec noms . . .	12	»	* candidum (L.) . . . . . p.	»	50	* SPRECKLIA glauca. . . . . p.	5	»
NB. Ces assortimens peuvent aussi			* flore pleno . . . . . p.	1	50	TIGRIDIA pavonia . . . . . p.	8	»
être donnés par 12, avec l'augmen-			* fol. varieg. albo . . . . . p.	1	50	TULIPES. Tulpen. Une collection de		
tation de 6 p. % du prix coté.			* concolor . . . . . p.	5	»	50 pièces en 25 variétés simples,		
Une collection de 50 pièces, assorties			* excelsum . . . . .	15	»	premier choix . . . . . %	13	»
dans les diverses couleurs, sans			* lancifolium (V. Sieb.) . . . .	8 à 12	»	Tulipes doubles mélangées, second		
noms . . . . .	20	»	forte à fleurir. . . . .	15	»	choix . . . . . %	8	»
Une collection de 50 pièces mélange	15	»	* Martagon (L.). . . . .	»	50	Duc de Berlin. . . . . %	10	»
Belgicus . . . . . p.	»	25	* pomponium (L.) . . . . .	1	»	Duc van Toll, pour forcer . . %	10	»
Botrioides . . . . . p.	»	50	* luteum . . . . . p.	1	»	doubles pour forcer . . . %	15	»
monstrosus . . . . . %	15	»	* tigrinum (Ker.). . . . . p.	1	50	Tulipes simples à fond blanc, pre-		
muscarî major. . . . . p.	»	40	* umbellatum . . . . .	3	50	mier choix . . . . . %	6	»
plumosus. . . . . p.	»	25	* venustum. . . . .	4	»	Tulipes simples à fond jaune, pre-		
IRIS persica (W.), odorante, wohlric-			NARCISSES A BOUQUETS JAUNES, Soleil			mier choix . . . . . %	6	»
hend. . . . . p.	»	20	d'or . . . . . p.	»	40	Tulipes simples mélangées dans les		
susiana . . . . . p.	1	10	A BOUQUETS AVEC CITRON ET			meilleures variétés . . . . %	5	»
xyphioides (J. Anglica). Dans di-			BLANC, Grand-Primo . . . p.	»	50	Tulipes monstrueuses ou Perroquets		
verses couleurs, assorties avec			Staaten-general . . . . . p.	»	40	o/o	15	»
noms . . . . . p.	»	25	DOUBLES, Incomparable . . p.	»	15	panachées . . . . . p.	»	20
En mélange. Im Rummel. . . %	10	»	Orange phoenix . . . . . p.	»	25	jaunes . . . . . p.	»	20
xyphium (J. Hispanica). En diverses			Sulphur phoenix . . . . . p.	»	50	Tulipa Stenopeta, tulipes chinoises à		
couleurs, assorties avec noms. %	6	»	Van Sion. . . . . p.	»	15	pétales pointues. Chineser Tulpen. p.	»	25
En mélange. Im Rummel. . . %	6	»	mélange, Rummel. . . . . %	8	»	VELTHIMIA capensis. . . . . p.	1	50
IXIA crocata . . . . . p.	»	50	de Constantinople, les meilleures			Carinatus. . . . . p.	3	»
Fenestralis . . . . . p.	»	50	pour forcer. Frühe Marseiller-			ZEPHYRANTHUS grandiflorus. . . .	2	»
Hyalina . . . . . p.	»	50	Tazetten, die sich vorzüglich zum			roseus. . . . .	3	»
leucantha. . . . . p.	»	50	Treiben eignen . . . . . %	20	»			

## GRAINES. — Saamen.

	fr.	c.		fr.	c.		fr.	c.
<b>Graines de Giroflées d'Erfurth.</b>			GRAINES DE PLANTES VIVACES DE			Une collection de 50 espèces et varié-		
30 Variétés très-distinctes.			PLEINE TERRE. Perennirende freie			tés, à notre choix. Eine Sammlung		
Le beau succès qu'ont obtenu les am-			Landpflanzen-Saamen.			von 50 Sorten, nach unserer Wahl . .	10	»
teurs à qui nous avons fourni de ces			Une collection de 50 espèces, à notre					
graines les années précédentes, nous en-			choix. Eine Sammlung von 50 Sorten,			GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES		
gage à les recommander spécialement;			nach unserer Wahl. . . . .	10	»	D'ORNEMENT DE PLEINE TERRE.		
nous les tirons directement d'Erfurth.						Zierbäume- und Gesträuch-Saa-		
Le paquet de 30 variétés assorties .	5	»	GRAINES FORESTIÈRES. Waldsaamen			men in's freie Land.		
						Une collection de 50 espèces, à notre		
GRAINES DE PLANTES ANNUELLES			GRAINES FOURRAGÈRES ET DE GRAN-			choix. Eine Sammlung von 50 Sorten,		
D'ORNEMENT. Sommerflor-Saa-			DE CULTURE. Wiesen- und Feld-			nach unserer Wahl . . . . .	12	50
men.			saamen.					
Une collection de 75 espèces et varié-			GRAINES DE PLANTES DE SERRE			<b>Oignons de fleurs de Hollande</b>		
tés, à notre choix. Eine Sammlung			CHAUDE ET D'ORANGERIE. Dran-			de toute espèce (voyez le Ca-		
von 75 Sorten, nach unserer Wahl. . .	10	»	gerie- und Warmhauspflanzen-			talogue spécial). Holländische		
Une collection de 50 espèces et varié-			Saamen.			Blumenzwiebeln von allen		
tés. Eine Sammlung von 50 Sorten,						Gattungen, wovon ein beson-		
nach unserer Wahl. . . . .	8	»				derer Catalog vorhanden ist.		

## TERRES DIVERSES. — Verschiedene Erdbarten.

### Gouano du Pérou.

C'est le plus puissant des engrais, en raison de la petite quantité qu'il en faut pour produire beaucoup d'effet. 230 kilog. par hectare pour les céréales. 100 kilog. équivalent à 4215 kilog. de fumier. Le kilog., 50 c.; ou 40 fr. les 100 kilog.

Souvent les plus belles plantes d'ornement de pleine terre et de serre, périssent entre les mains des amateurs les plus passionnés, faute de bonne terre de bruyère : par conséquent, nous offrons, à raison de 1 fr. 50 c., le double décalitre (25 kil.) de terre de bruyère reposée et tamisée. Cette quantité remplit environ 50 pots de 12 à 15 centimètres de diamètre, et par là, l'ami des plantes peut se procurer le doux plaisir de voir prospérer les végétaux les plus délicats. L'on peut aussi se procurer chez nous de la terre qui a la propriété de changer en bleu les fleurs des Hortensias, à raison de 4 fr. les 50 kil.

### Guano aus Peru.

Ein kräftiges Düngmittel für jeden Gebrauch. Man braucht 230 Kilog. um einen Hektar Boden zu düngen in welchen man Korn oder Weizen säen will. 100 Kil. machen den Werth von 4215 Kilog. Kuhdünger. Das Kilog. zu 50 Cent.; oder 100 Kilog. zu 40 Fr.

Aus Mangel an guter Heidenerde verderben oft manchem eifrigen Liebhaber die schönsten Zierpflanzen im freien Lande und im Gewächshause. Daher bieten wir den doppelten Dekaliter (etwa 25 Kilog.) gerührter, wohlbereiteter und gesiebter Heidenerde zu 1 Fr. 50 C. an, womit sich etwa 50 Töpfe von 12 bis 15 Centimeter im Durchmesser füllen lassen; so kann sich der Blumenfreund seine schuldlosen Freuden leicht vermehren und selbst manche der zärtlichsten Pflanzen üppig gedeihen sehen. Man kann bei uns auch Erde, mit der Eigenschaft die Hortensia blau blühen zu machen zu 4 Fr. die 50 Kilog. haben.



# European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

**Digital version sponsored by:**  
C. A. Wimmer